

الشهاب العلمي

سبتمبر 2026

ECHIHEB EL-ILMI

العدد الحادي عشر

عالم النجوم

THE STELLAR WORLD

ملف
العدد

مجلة الشهاب العلمي / العدد الحادي عشر / 2026

يورغن كريستنسن-دالسغارد

Jørgen Christensen-Dalsgaard

عالم النجوم الدانماركي



كريم زغيب

Karim Zaghieb

عالم الكيمياء الجزائري



كارلا ميتشل

Carla Mitchell

مديرة فهمة Africa2Moon



ECHIHEB EL-ILMI
Science Magazine
Sirius Astronomy Association
& CERIST - ALGERIA
<http://mediation.cerist.dz/chiheb>
ISSN: 2992-1678

مجلة الشهاب العلمي
من إنتاج جمعية الشعري لعلم الفلك و CERIST قسنطينة الجزائر



مجلة علمية تصدر عن وحدة البحث في الوساطة العلمية (CERIST)، جمعية الشعري لعلم الفلك الجزائرية، ومديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالجزائر (DGRSDT). تتناول المواضيع الفلكية بصفة خاصة والعلمية بصفة عامة، من إعداد ثلة من الباحثين وهواة الفلك المتقدمين من شتى المجالات.

تهدف مجلة الشهاب العلمي إلى نشر الثقافة العلمية و تبسيطها للعامة، ومحاولة تقريب الأفكار من المصادر الموثوقة عن طريق الحوارات التي تجريها مع العديد من العلماء والباحثين في أنحاء المعمورة.

اسم المجلة مستوحى من مجلة الشهاب التي أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذي قام بدور كبير في إعداد الشعب الجزائري للكفاح المظفر من أجل الاستقلال.

موقع المجلة على الإنترنت
<http://mediation.cerist.dz/chiheb>
chihebmagazine@gmail.com

موقع جمعية الشعري
www.siriusalgeria.net

موقع مركز البحث
في الإعلام العلمي والتقني
www.cerist.dz
ISSN: 2992-1678

كلمة العدد

«بين نبضات النجوم وشجون البشرية»

قبل قرن من الزّمان، كان علم الفلك يخطو خطواته الأولى نحو فهم أسرار الأجرام السماوية. أمّا اليوم، فنحن نرى النجم كأكثر الأجسام أساسية في الكون؛ ومثلما تُمثل الخلية البيولوجية اللبنة الأساسية لكل كائن حي، فإنّ النّجم هو الرّحم الجوهري الذي لا غنى عنه في بناء النسيج الكوني، وضهر العناصر الثقيلة الضرورية للحياة. ففي قلبه تُصهر هذه العناصر الثقيلة، وحوله تتشكّل الأنظمة الكوكبية التي تصنع نسيج البيئة المجريّة خلف الكواليس.

يستقطبكم هذا العدد الحادي عشر إلى عمق «العالم النجمي»، ومن خلال ملفنا الرئيسي، يستكشف مساهمونا خبايا الآليات الداخلية لتلك المفاعلات الاندماجية الحرارية النوويّة. كما أنّ لنا شرف استضافة قامة كبرى في الفيزياء النجمية في صفحاتنا، وهو العالم الدنماركي يورغن كريستنسن-دالسغارد (-Jørgen Christensen Dalsgaard)، الأب الروحي لتخصص «علم فلك زلازل النجوم» (Astroseismology)؛ هذا العلم الذي يشهد ازدهارًا كبيرًا. حيث يستمع إلى نبضات النجوم واهتزازاتها ليرسم لنا خريطة لأعماقها الخفية. كما يستضيف العدد كارلا شارب (Carla Sharpe) للحديث عن مشروع «Africa2Moon»، وهي مبادرة تاريخية بارزة تقودها «مؤسسة تطوير الفضاء الأفريقية» لإطلاق أوّل مهمة علمية للقارة نحو القمر، وفي الوقت نفسه إلهام الجيل القادم من العلماء والمهندسين الأفارقة.

وكالعادة، تحظى العلوم الأخرى بتغطية واسعة حيث نستضيف بشكل خاص الباحث الجزائري البروفيسور كريم زغيب، أحد أبرز القامات العالمية في مجال بطاريات الليثيوم والذي يفكّك لنا شغرات ومستقبل هذا «الذهب الأبيض» في مسار الانتقال الطاقوي، والفرص الاستراتيجية المتاحة للجزائر. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم المجلة، من الفيزياء الأساسية إلى الابتكارات التكنولوجية الإقليمية، بانوراما غنيّة ومتاحة لكل العقول الشغوفة. كما تستمرّ أقسامنا المعتادة، بما في ذلك المساحات المخصّصة للقراء الصّغار، وأبرز المستجدّات العلمية، في مدّ جسور متينة بين الصرامة الأكاديمية والتلقي المعرفي للمواطنين.

ولكن، بينما ترتفع عيوننا لتأمل السماء، لا يمكن لضمائرنا أن تغضّ الطرف عن واقع الأرض المأساوي. إنّ ملف غزة حاضر في هذا العدد كالعادة، مع التركيز بشكل خاص على مبادرة «غزة تقرأ». فبين الركام، تأتي هذه الحملة لتؤكد أن المعرفة تظلّ السلاح الأسمى للصمود. ومثلما تحوّل النجوم مادتها إلى ضوء يمزّق عتمة الفضاء، يحوّل أهل غزة آلامهم إلى صمود فكري يبهّر العالم، ومن رماد الدمار سينبعث حتمًا نور البناء والولادة الجديدة. عسى أن يذكّرنا هذا العدد بأنّ السعي وراء المعرفة لا ينفصل أبدًا عن الدفاع عن الكرامة الإنسانية. يعلمنا «علم زلازل النجوم» أن ننصت للاهتزازات الخفيّة في أعماق النجوم، ويفرض علينا التاريخ أن ننصت لنبضات الحرية والصمود في قلوب المظلومين.

جمال ميموني

فهرس المواضيع

كلمة العدد

ملف العدد : العالم النجمي

- 03 كيف تولد النجوم وكيف تموت؟- هشام قرقوري
06 تنوع النجوم: كيف يكشف الضوء أسرار الكون؟- عمر نمول
10 عندما تكسر النجوم قواعد الفيزياء- جمال ميموني
14 قصة الجرم السماوي: حلّ لغز عمره 850 عامًا- جمال ميموني
17 ضيف العدد: لقاء حصري مع الفلكي يورغن كريستنسن-دالسغارد.
22 جائزة شو2026 Shaw لشخصيتين بارزتين - جمال ميموني

مقالات علمية

- 24 حوار مع كارلا ميتشل: مؤسسة مشروع «إفريقيا إلى القمر».
28 كيف يقود الليثيوم مستقبل السيارات الكهربائية؟ حوار مع د.كريم زغيب.
33 أرتيميس II حلم العودة للقمر يتجدد- الشيماء أمين خوجة
36 ما وراء الألواح الشمسية- عيسى مفلح
38 الطاقة الشمسية على سطح القمر - فاطمة الزهراء بن عراب
40 الهيدروجينولوجيا: مياه الأرض وحرارتها - طارق درياس
42 رائد الهندسة الكروية والفلك الرياضي أبو النصر منصور بن عراق
47 خالد سعد الله
47 مغامرة فلكية في قلب صحراء الجزائر - عمرو عبد الوهاب

بأباراتزي العلوم

- 44 آخر المستجدات العلمية، جمال ميموني، الشيماء أمين خوجة

ملف خاص - حتى لا ننسى فلسطين

- 51 يا ابن أكثر من أب: الرسامة الفلسطينية فاطمة علي أبو عودة
52 مبادرة «غزة تقرأ»: معركة من أجل إنقاذ الذاكرة - ياسمين بوالجديري
54 أزمة الغذاء تفاقم معاناة النازحين في غزة - ياسمين بوالجديري
55 45 درجة مئوية تحت الخيام: إبادة بيئية متواصلة منذ قرن

الشاطر الصغير

- 58 تعرف على قصة حياة النجوم - خديجة طوبال
59 كيف بدأ الإنسان رحلته مع السّماء؟ - مهدي فضلان
60 اختبر معلوماتك عن كسوف الشمس - أسراء حمدوش، محمد سراج حمدوش
61 ألعاب وتحديات - الشيماء أمين خوجة

من كل سديم نجمة

- 62 الأخبار الوطنية، العربية والإفريقية
66 فيلم العدد: مشروع هيل ماري، هشام قرقوري
67 خير جليس: رجل القش، ياسمين بوالجديري


Table of Contents

كيف تولد النجوم؟ وكيف تموت؟

How Stars Are Born and How They Die

بقلم د. هشام قرقوري

وحدة البحث في الوساطة العلمية - CERIST



والحرارة التي تجعل الحياة ممكنة على الكواكب المحيطة بها. لكن النجوم لا تعيش إلى الأبد، فلكل نجم قصة تختلف باختلاف كتلته. فالنجوم الصغيرة، مثل شمسنا، تنهي حياتها بهدوء نسبي عندما تتحول إلى عملاقة حمراء ثم تقذف طبقاتها الخارجية، تاركة وراءها قزماً أبيض يبرد ببطء عبر مليارات السنين. أما النجوم الضخمة فتتسلك طريقاً أكثر عنفاً؛ إذ تنفجر في أحداث كونية مذهلة تُعرف بالمستعرات العظمى، مطلقة طاقة تفوق ما تنتجه مجرات بأكملها في لحظات قصيرة، وقد تخلف وراءها نجماً نيوترونياً فائق الكثافة أو ثقباً أسود تبتلع جاذبيته حتى الضوء نفسه.

منذ آلاف السنين والنجوم تثير فضول الإنسان، فهي تبدو كنقاط ضوء هادئة تزيّن السماء الليلية، لكن وراء هذا الهدوء تختبئ حياة معقدة تحكمها قوانين الفيزياء. فالنجوم ليست مجرد كرات ملتهبة معلقة في الفضاء، بل هي مصانع كونية هائلة تُنتج الطاقة والعناصر الكيميائية التي تشكل اللبنة الأساسية للكواكب والحياة. تبدأ النجوم رحلتها من سحب ضخمة من الغاز والغبار، ثم تنهار تحت تأثير الجاذبية لتولد كنجم جديد، وبعد ذلك تقضي ملايين أو حتى مليارات السنين وهي تحول الهيدروجين إلى هيليوم في قلبها، مطلقة كميات هائلة من الضوء

عالم النجوم

THE STELLAR WORLD

محتويات الملف

03	كيف تولد النجوم؟ وكيف تموت؟ - هشام قرقوري
06	تنوع النجوم: كيف يكشف الضوء أسرار الكون- عمر نمول
10	عندما تكسر النجوم قواعد الفيزياء - جمال ميموني
14	قصة الجرم السماوي P30: حل لغز عمره 850 عامًا - جمال ميموني
17	ضيف العدد: لقاء حصري مع الفلكي يورغن كريستنسن-داسلغارد
22	جائزة شو 2026 Shaw لشخصين بارزين - جمال ميموني



الشكل 1: سديم سحابة «رهو أوفيوخوس» كما رصده تلسكوب جيمس ويب، كاشفًا نجومًا أولية فتية تتشكل داخل سحب كثيفة من الغاز والغبار.

من السحب البين نجمية إلى النجوم الأولية

تولد النجوم داخل سحب هائلة من الغاز والغبار تُعرف باسم السحب الجزيئية العملاقة. تتكوّن هذه السحب أساسًا من الهيدروجين، وتكون شديدة البرودة وقد تمتد لمئات السنين الضوئية. ورغم أن هذه السحب تبدو مستقرة، فإن اضطرابات كونية مثل انفجار نجم قريب أو اصطدام سحب غازية قد تؤدي إلى بدء الانهيار الجاذبي داخل بعض مناطقها. ومع استمرار الجاذبية في جذب المادة نحو الداخل، تتكوّن نواة كثيفة وساخنة تُعرف باسم النجم الأولي. و خلال هذه المرحلة تتشكل حوله بنية دائرية من الغاز والغبار تسمى قرص التراكم، الذي الذي يستمر في تغذية النجم بالمادة. ومع ازدياد الضغط ترتفع درجة الحرارة تدريجيًا، لكن الاندماج النووي لم يبدأ بعد، ويكون لمعان النجم ناتجًا أساسًا عن الطاقة الناجمة عن الانهيار الجاذبي.

مرحلة التسلسل الرئيسي: الحياة المستقرة الطويلة

تُمثل مرحلة التسلسل الرئيسي أطول فترة في حياة النجم وأكثرها استقرارًا. خلال هذه المرحلة يتحقق توازن دقيق يُعرف باسم التوازن الهيدروستاتيكي. فالجاذبية تحاول باستمرار ضغط النجم نحو الداخل، بينما يدفع الضغط الناتج عن الاندماج النووي المادة نحو الخارج. يحافظ هذا التوازن على استقرار النجم لملايين أو

مليارات السنين. تعتمد مدة هذه المرحلة أساسًا على كتلة النجم: النجوم الضخمة تكون أكثر حرارة ولمعًا، لكنها تستهلك وقودها بسرعة كبيرة، لذلك تكون أعمارها قصيرة نسبيًا، وقد لا تعيش سوى بضعة ملايين من السنين فقط. فالنجوم العملاقة الزرقاء مثلًا قد تنفد طاقتها خلال 10 إلى 50 مليون سنة. أما النجوم متوسطة الكتلة، مثل الشمس، فتعيش لفترات أطول بكثير قد تصل إلى نحو 10 مليارات سنة.

في المقابل، تحرق النجوم الصغيرة ذات الكتلة المنخفضة وقودها ببطء شديد، ولذلك يمكن أن تعيش لمئات المليارات أو حتى تريليونات السنين، وهي مدة تفوق العمر الحالي للكون نفسه.

-تقع شمسنا حاليًا في مرحلة التسلسل الرئيسي، وقد عاشت بالفعل حوالي 4.6 مليار سنة، ومن المتوقع أن تستمر في هذه المرحلة لنحو 5 مليارات سنة أخرى قبل أن تبدأ بالتحول إلى عملاق أحمر.

عندما ينفد الهيدروجين

مع مرور الزمن ينفد الهيدروجين من قلب النجم، فيبدأ اللب بالانكماش تحت تأثير الجاذبية، بينما تتمدد الطبقات الخارجية بشكل هائل، ليتحول النجم إلى عملاق أحمر. يحدث هذا التطور أساسًا في النجوم متوسطة الكتلة مثل الشمس، وكذلك في النجوم الضخمة التي تتحول إلى عملاقة حمراء أو فوق عملاقة حمراء بحسب كتلتها.

يؤدي ارتفاع درجة حرارة اللب إلى بدء نوع جديد من الاندماج النووي، حيث تندمج نوى الهيليوم عبر عملية تُعرف باسم العملية الثلاثية ألفا لتكوين الكربون والأكسجين. خلال هذه المرحلة يصبح النجم غير مستقر وتبدأ تغيرات كبرى في بنيته الداخلية، تهيئًا للمراحل الأخيرة من حياته.

أما النجوم صغيرة الكتلة جدًا، مثل الأقزام الحمراء، فإنها تتطور بطريقة مختلفة. فهي تستهلك وقودها النووي ببطء شديد وتتميز بقدرتها على خلط مادتها الداخلية بكفاءة، مما يسمح لها باستخدام معظم الهيدروجين الموجود داخلها. ولهذا لا تمر بمرحلة العملاق الأحمر بالشكل المعروف، بل تبقى مستقرة لفترات.



الشكل 2: حين تموت النجوم العملاقة، قد تخلف وراءها أحد أكثر الأجسام غريبة في الكون: نجمًا نيوترونيًا نابضًا أو ثقبًا أسود يطوي الزمكان بجاذبيته الهائلة.

موت النجوم: نهايات مختلفة

النجوم القزمة صغيرة الكتلة

النجوم صغيرة الكتلة، مثل الأقزام الحمراء، تخفت تدريجيًا وتفقد لمعانها مع مرور الزمن وبعد استهلاك معظم الهيدروجين الموجود داخلها، لتنتهي كأجسام نجمية باردة وخافتة بعد عمر طويل جدًا.

النجوم منخفضة الكتلة

نجوم مشابهة للشمس لا تستطيع إنتاج درجات حرارة كافية لدمج العناصر الثقيلة. لذلك تقوم بطرد طبقاتها الخارجية إلى الفضاء، مشكلةً سحابة مضيئة تُعرف باسم السديم الكوكبي.

أما القلب المتبقي فيتحول إلى قزم أبيض، وهو جسم شديد الكثافة بحجم الأرض تقريبًا لكنه يحتوي على كتلة تقارب كتلة الشمس. وبعد

توقف الاندماج النووي يبدأ هذا القزم الأبيض بالتبرد ببطء شديد عبر مليارات السنين.

النجوم الضخمة


أما النجوم الضخمة فتعيش نهاية أكثر عنفًا. ففي داخلها تستمر عمليات الاندماج لتكوين عناصر أثقل تدريجيًا:

الهيدروجين ← الهيليوم ← الكربون ← الأكسجين ← السيليكون ← الحديد

لكن الحديد يمثل نهاية الطريق، لأن اندماجه لا يحرر طاقة. وعندما يتكوّن قلب من الحديد يفقد النجم قدرته على مقاومة الجاذبية. ينهار اللب بسرعة هائلة، مما يؤدي إلى انفجار كوني ضخم يُعرف باسم المستعر الأعظم (السوبرنوبا).

وقد ينتج عن هذا الانهيار:

نجم نيوتروني: يتكوّن إذا كانت كتلة النجم الأصلية تتراوح تقريبًا بين 8 و20 كتلة شمسية. وخلال الانهيار تندمج البروتونات والإلكترونات



الشكل 4: مخطط يوضح المراحل الرئيسة لدورة حياة النجوم. من السحب الجزيئية وتكوّن النجوم الأولية إلى المراحل النهائية التي تحدد كتلة النجم.


لتكوين نيوترونات، فيتشكل جسم فائق الكثافة لا يتجاوز قطره عشرات الكيلومترات، لكنه قد يحتوي على كتلة أكبر من كتلة الشمس.

ثقب أسود: يتشكل عندما تكون كتلة النجم الأصلية كبيرة جدًا، وتتجاوز عادةً نحو 20 إلى 25 كتلة شمسية. في هذه الحالة تصبح الجاذبية هائلة لدرجة أن الانهيار يستمر دون أن تتمكن أي قوة معروفة من إيقافه، فتتكون منطقة لا يستطيع حتى الضوء الهروب منها، تُعرف بالثقب الأسود.


«نحن مصنوعون من غبار النجوم»!

النجوم ليست أجرامًا أبدية، بل كائنات كونية تمر بدورة حياة كاملة: تولد من سحب الغاز الباردة، وتضيء الكون عبر الاندماج النووي، ثم تموت بهدوء أو بانفجارات هائلة. لكن موتها لا يمثل النهاية، لأن العناصر التي تتشكل في أعماقها تعود لتنتشر في الفضاء وتشارك في بناء نجوم وكواكب وأشكال جديدة من الحياة.

إن ذرات الكربون والأكسجين والحديد الموجودة في أجسامنا اليوم صُنعت داخل نجوم قديمة انفجرت وماتت قبل مليارات السنين، ولهذا قال عالم الفلك كارل سيغان (Carl Sagan) عبارته الشهيرة: «نحن مصنوعون من غبار النجوم». في هذا الترابط الكوني المدهش، تحمل كل ذرة في أجسامنا قصة نجوم بعيدة ساهمت في تشكيل الكون والحياة كما نعرفها اليوم.



الشكل 5: يتكوّن جسم الإنسان في معظمه من أربعة عناصر رئيسية هي الأكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين، بينما تؤدي العناصر النزرة أدوارًا حيوية رغم ضآلة نسبها.



ومع تطور علم التحليل الطيفي في القرن التاسع عشر، اكتشف العلماء أن ضوء النجوم يحمل معلومات مذهلة عن طبيعتها الفيزيائية. فعندما يُحلل ضوء النجم إلى ألوانه المختلفة، كما يحدث في قوس المطر، تظهر خطوط دقيقة تسمح بتحديد درجة حرارته وتركيبه الكيميائي وحتى حركته في الفضاء. ومن هنا وُلد نظام التصنيف الطيفي الشهير الذي يقسم النجوم إلى الفئات: O، B، A، F، G، K و M مرتبة من الأعلى حرارة إلى الأقل حرارة. وتُعد نجوم الفئة O من أندر النجوم وأكثرها غنًا و سطوعًا، إذ تشع بلون أزرق حاد وتطلق كميات هائلة من الطاقة تجعلها تستهلك وقودها بسرعة مذهلة. أما شمسنا فتتنتمي إلى الفئة G، وهي نجوم صفراء مستقرة نسبيًا وفرت الظروف المناسبة لظهور الحياة على الأرض. وفي الطرف الأبرد من السلسلة توجد النجوم الحمراء من الفئة M، وهي الأكثر انتشارًا في مجرتنا درب التبانة. وهكذا أصبح الضوء أشبه بلغة كونية دقيقة، تحمل داخلها أسرار النجوم وخصائصها. لكن اللون ودرجة الحرارة ليسا سوى جزء من القصة، لأن هناك خاصية أعمق تتحكم في مصير النجم بالكامل، من لحظة ولادته حتى نهايته، وهي الكتلة.

الكتلة: الهوية الحقيقية للنجوم

إذا كان لون النجم يكشف لنا درجة حرارته، فإن الكتلة تكشف قصته كاملة تقريبًا. ففي عالم النجوم، تُعد الكتلة العامل الحاسم الذي يحدد مصير النجم منذ ولادته وحتى نهايته. إنها الخاصية التي تتحكم في درجة الحرارة واللمعان والحجم وطول العمر، وحتى الطريقة التي سيموت بها

حين توجد نجوم صغيرة وخافتة بالكاد يمكن رصدها حتى بأجهزة الرصد الحديثة. والأكثر إدهاشًا أن أعمار النجوم تختلف بصورة هائلة؛ فبعضها يعيش حياة قصيرة وعنيفة لا تتجاوز بضعة ملايين من السنين، بينما تستطيع نجوم أخرى الاستمرار في الإشعاع لمئات المليارات من السنين، أي لفترة أطول من العمر الحالي للكون نفسه. ورغم هذا التنوع المذهل، اكتشف العلماء أن وراءه نظامًا فيزيائيًا بالغ الدقة والجمال. فاللون الذي نراه ليس مجرد خاصية جمالية، بل هو مفتاح يكشف درجة حرارة النجم وطبيعة الطاقة التي ينتجها في أعماقه. ومن هنا بدأ الضوء يتحول من مجرد وسيلة للرؤية إلى لغة علمية كاملة تسمح للبشر بفهم النجوم رغم المسافات الهائلة التي تفصلنا عنها.

كيف تكشف ألوان النجوم حرارتها؟

قد تخدعنا المسافات الكونية الشاسعة فتجعل النجوم تبدو متشابهة، لكن التأمل الدقيق يكشف اختلافات واضحة حتى بالعين المجردة. ففي كوكبة الجبار مثلًا، يظهر نجم منكب الجوزاء بلونه الأحمر المائل إلى البرتقالي، وكأنه جمرة كونية متوهجة، بينما يسطع نجم رجل الجبار بلون أزرق أبيض حاد يوحي بطاقة هائلة. هذه الألوان ليست مجرد تفاصيل جمالية، بل إشارات فيزيائية دقيقة تكشف طبيعة النجوم نفسها. فاللون في عالم النجوم يرتبط مباشرة بدرجة الحرارة. النجوم الزرقاء تُعد من أكثر النجوم سخونة في الكون، إذ قد تصل حرارة أسطحها إلى عشرات الآلاف من الدرجات، بينما تكون تلك الحمراء أبرد نسبيًا، رغم أنها ما تزال أشد حرارة بكثير من أي شيء مألوف على الأرض. أما النجوم البيضاء والصفراء، مثل الشمس، فتقع في منطقة وسطى من هذا السلم الحراري الكوني.

والمثير للاهتمام أن هذه الظاهرة ليست بعيدة عن خبرتنا اليومية. فعندما يُسخَّن معدن ما تدريجيًا، يبدأ بالتوهج الأحمر، ثم يتحول إلى البرتقالي فالأصفر، قبل أن يصل إلى الأبيض المزرق عند درجات الحرارة الأعلى. النجوم تتبع المبدأ الفيزيائي نفسه، لكنها تفعل ذلك على نطاق يفوق الخيال، إذ تمثل كرات عملاقة من الغاز الساخن تشع الضوء باستمرار بسبب

في ليالي الشتاء الصافية، تبدو السماء وكأنها لوحة هادئة مرصعة بآلاف النقاط المضيئة المتشابهة. وللوهلة الأولى، قد يعتقد المرء أن جميع النجوم متقاربة في طبيعتها، وأن اختلافها يقتصر على شدة اللمعان فقط. غير أن علم الفلك الحديث كشف لنا حقيقة أكثر إثارة بكثير، فالنجوم ليست متشابهة أبدًا، بل تمثل عالمًا هائل التنوع والتعقيد، حيث يمتلك كل نجم خصائصه الفيزيائية الخاصة وتاريخه الكوني المختلف. فبينما تتوهج بعض النجوم بلون أزرق ساطع يكاد يلامس البياض، تشع نجوم أخرى بضوء أحمر هادئ، وتتلألأ نجوم مثل شمسنا بلون أصفر ذهبي مألوف. وهناك نجوم تفوق الشمس حجمًا بمئات المرات وتطلق طاقة هائلة تجعلها تُرى عبر مسافات كونية شاسعة، في


تنوع النجوم

كيف يكشف الضوء أسرار الكون؟

Stellar Diversity: How Light Reveals the Secrets of the Universe

بقلم د. عمر نمول

وحدة البحث في الوساطة العلمية - CERIST



النجم في نهاية حياته. ولهذا يصف علماء الفلك الكتلة بأنها "الهوية الحقيقية" للنجم. لفهم ذلك يمكن تخيل النجم كمعركة كونية مستمرة بين قوتين هائلتين. فمن جهة تحاول الجاذبية ضغط مادة النجم نحو الداخل تحت تأثير كتلته الضخمة، ومن جهة أخرى تدفع الطاقة الناتجة عن الاندماج النووي نحو الخارج. وطوال حياة النجم يبقى هذا التوازن الدقيق قائماً بين الانهيار والانفجار، بين الجاذبية والطاقة.

كلما ازدادت كتلة النجم، ازدادت قوة الجاذبية في مركزه، مما يؤدي إلى ضغط هائل يرفع درجة الحرارة في القلب إلى مستويات مذهلة. وهناك تبدأ عملية الاندماج النووي، حيث تندمج نوى الهيدروجين لتكوين الهيليوم، مطلقة كميات هائلة من الطاقة وفق معادلة أينشتاين الشهيرة التي تربط الكتلة بالطاقة $E=mc^2$. هذه الطاقة هي التي تجعل النجوم تتوهج وتقاوم الانهيار تحت تأثير جاذبيته. لكن النجوم لا تحرق وقودها جميعاً بالمعدل نفسه، فالنجوم الضخمة رغم امتلاكها كميات أكبر من الوقود، تستهلكه بسرعة هائلة بسبب الحرارة والضغط الشديدين في أنويتها. ولهذا تصبح أكثر سخونة ولمعاً، وتشع غالباً بضوء أزرق قوي قد يفوق لمعان الشمس بألاف أو حتى ملايين المرات.

غير أن هذا التألق العنيف له ثمن قاسٍ، إذ تعيش هذه النجوم حياة قصيرة نسبياً قد تنتهي بانفجارات هائلة تُعرف بالمستعرات العظمى، وهي من أعنف الظواهر في الكون. أما النجوم الصغيرة، فتعيش بطريقة مختلفة تماماً. فجاذبيتها الأضعف تجعل درجات الحرارة في أنويتها أقل، وبالتالي يحدث الاندماج النووي ببطء شديد. لهذا تبدو هذه النجوم أبرد وأخفت لمعاً وتميل إلى اللون الأحمر، لكنها تعيش فترات زمنية هائلة قد تتجاوز مئات المليارات من السنين، أي أطول بكثير من العمر الحالي للكون.

هنا تظهر واحدة من أكثر المفارقات إثارة في علم الفلك، فالنجوم الأكبر ليست الأطول عمراً، بل على العكس تماماً. فالنجوم العملاقة تعيش بسرعة وتتحرق بعنف ثم تموت مبكراً، بينما تعيش النجوم الصغيرة حياة هادئة وبطيئة تمتد عبر الأزمنة الكونية السحيقة.

ومن هذا الترابط بين الكتلة ودرجة الحرارة واللمعان، بدأ علماء الفلك يدركون أن النجوم لا تتوزع عشوائياً في الكون، بل تخضع لنظام


واضح يمكن تمثيله ورؤيته على خريطة علمية مذهلة ستغير فهمنا للنجوم إلى الأبد: مخطط هرتزبرونغ-راسل.

مخطط هرتزبرونغ-راسل: الخريطة الكبرى لحياة النجوم

مع اكتشاف العلاقة العميقة بين لون النجم وحرارته وكتلته، بدأ علماء الفلك يدركون أن النجوم لا تتوزع عشوائياً في الكون، بل تخضع لنظام فيزيائي واضح يمكن تمثيله على خريطة علمية واحدة. وفي بداية القرن العشرين، قاد هذا الإدراك العالمين إينار هرتزبرونغ وهنري نوريس راسل إلى بناء واحد من أهم الأدوات في تاريخ الفيزياء الفلكية: مخطط هرتزبرونغ-راسل، المعروف اختصاراً بمخطط HR. قد يبدو هذا المخطط للوهلة

الأولى مجرد رسم بياني بسيط، لكنه في الحقيقة أشبه بخريطة كونية تكشف البنية الخفية لعالم النجوم. فمن خلاله يستطيع علماء الفلك تحديد نوع النجم ومرحلته العمرية وخصائصه الفيزيائية، بل وحتى التنبؤ بمصيره النهائي. ولهذا أصبح مخطط HR أداة أساسية لفهم تطور النجوم عبر الزمن.

عند النظر إلى المخطط، يلاحظ القارئ أمراً غير مألوف، فدرجة الحرارة على المحور الأفقي لا تزداد من اليسار إلى اليمين كما في الرسوم البيانية التقليدية، بل يحدث العكس تماماً. فالنجوم الأكثر حرارة تحتل الجهة اليسرى، بينما تتمركز النجوم الأبرد في الجهة اليمنى. أما المحور العمودي فيمثل لمعان النجوم، أي كمية الطاقة التي تشعها إلى الفضاء، بحيث توجد النجوم الشديدة السطوع في



أعلى المخطط، والنجوم الخافتة في أسفله. وعندما بدأ العلماء في وضع النجوم على هذا المخطط، ظهرت أنماط مدهشة لم تكن متوقعة. فالنجوم لم تتبع توزيعاً عشوائياً، بل تجمعت في مناطق واضحة، وكأن الكون يرسم خريطته الخاصة وفق قوانين دقيقة تربط بين الحرارة واللون والكتلة واللمعان.


التسلسل الرئيسي: المرحلة المستقرة في حياة النجوم

أبرز منطقة في مخطط HR هي شريط قطري يمتد من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين، ويُعرف باسم «التسلسل الرئيسي». وفي هذه المنطقة تقضي النجوم معظم حياتها، ولذلك يمكن اعتبارها المرحلة الطبيعية والمستقرة في تطور النجوم. في أعلى التسلسل الرئيسي تتمركز النجوم الزرقاء العملاقة، شديدة الحرارة واللمعان، التي تستهلك وقودها النووي بسرعة هائلة. أما في أسفله فتوجد النجوم الحمراء الصغيرة والباردة نسبياً، الخافتة الضوء لكنها طويلة العمر بصورة مذهلة. بين هذين الطرفين تقع شمسنا في موقع متوسط تقريباً، بحرارة معتدلة ولمعان متوسط ولون أصفر مميز. وخلال هذه المرحلة يحافظ النجم على التوازن الدقيق بين الجاذبية التي تحاول ضغط المادة نحو الداخل، والطاقة الناتجة عن الاندماج النووي التي تدفع نحو الخارج.

ويحدد موقع النجم على التسلسل الرئيسي أساساً بكتلته. فالنجوم الضخمة تمتلك أنوية أكثر سخونة وتُجري الاندماج النووي بسرعة أكبر، ولذلك تكون أكثر لمعاً وأقصر عمراً. أما النجوم الصغيرة، فتندمج الهيدروجين ببطء شديد، فتكون أقل لمعاً لكنها تعيش لفترات زمنية هائلة. ولهذا يظهر النسق الأساسي على شكل شريط قطري ترتبط فيه الحرارة واللمعان ارتباطاً وثيقاً. لكن هذا الاستقرار لا يدوم إلى الأبد. فعندما يبدأ الهيدروجين بالنفاد من قلب النجم، تبدأ رحلته نحو مراحل جديدة أكثر غرابة وإثارة. ومع مغادرة النجم للتسلسل الرئيسي، ينتقل إلى مناطق أخرى من مخطط هرتزبرونغ-راسل تعكس المراحل اللاحقة من تطوره. فبعض النجوم تتمدد وتصبح عملاقة أو عملاقة فائقة

ومن أجمل ما تكشفه الفيزياء الفلكية أن هذا التنوع الهائل للنجوم لا يحدث عشوائياً، بل يمكن فهمه من خلال سلسلة مترابطة من القوانين البسيطة والعميقة في الوقت نفسه. فكل شيء يبدأ بالكتلة، لأنها العامل الأساسي الذي يحدد البنية الداخلية للنجم، والبنية تحدد الحرارة، والحرارة تحدد اللون واللمعان، وهذه الخصائص جميعها تحدد مكان النجم ضمن الخريطة الكبرى للنجوم. من خلال هذه العلاقات استطاع العلماء فهم كيف تولد النجوم، وكيف تعيش، وكيف تنتهي رحلتها في أعماق الكون. هكذا تتحول السماء الليلية من منظر جميل إلى كتاب كوني مفتوح، فكل نجم يلعب فوقنا ليس مجرد ضوء بعيد، بل شاهد على قوانين الطبيعة التي صنعت الكون، وعلى رحلة كونية طويلة بدأت قبل مليارات السنين وما تزال مستمرة حتى اليوم.

خريطة كونية مكتوبة بالضوء



الشكل 3: المراحل الرئيسية لتطور نجم شبيه بالشمس، من النجم الأولي إلى العملاق الأحمر ثم القزم الأبيض.

عندما تكسر النجوم قواعد الفيزياء

When Stars Break the Rules of Physics

بقلم د. جمال ميموني

وحدة البحث في الوساطة العلمية - CERIST



تبدو النجوم بالنسبة للكثيرين، كرموز للثبات الأبدي عند التأمل في سماء الليل. في مقالات أخرى ضمن هذا الملف حول النجوم، أرحنا الستار عن «النموذج القياسي» لحياة النجوم. لقد تعلمنا كيف تدخل الجاذبية والاندماج النووي في لعبة شد حبل تستمر لمليارات السنين، وكيف توفر سلسلة بروتون - بروتون (pp) ودورة الكربون والنيوتروجين والأكسجين (CNO) النبض الطاقوي لغالبية النجوم التي نراها. نادراً ما يكون العلم كتاباً منتهياً، فنحن نكتشف الآن أن خلف التوهج المألوف للدب الأكبر أو الجبار، توجد فصول مفقودة في سيرة النجوم، و«وحوش» في حديقة الحيوان الكونية تتحدى الفيزياء التقليدية المدونة في الكتب المدرسية وحتى

الجامعية. فمثلاً، حتى الانفجارات النجمية لا ينبغي أن تكون قادرة على الحدوث أصلاً. هذا المقال هو رحلة في ظلال التطور النجمي. سنستكشف «الأشباح» التي تكمن في الكون المبكر، والمادة «الغريبة» التي قد تكون أكثر استقراراً من الذرات في أجسامنا، والحقيقة المذهلة المتمثلة في أننا ما زلنا لا نفهم بشكل تام كيف يموت النجم فعلياً وكيف تتصرف المادة عند كثافة ودرجات حرارة مفرطتين. ومع ذلك، فإن بعض النجوم الافتراضية المذكورة هنا قد لا تكون موجودة في الواقع، وستظل نظرية بحتة إلى أن تتمكن التطورات المستقبلية في الفيزياء من إثباتها أو دحضها.

تخيل متزلجاً على الجليد يدور حول نفسه، لكن الآلية عندما يضم ذراعيه إلى الداخل، فإنه يدور بشكل أسرع. الآن، تخيل سحابة غازية يبلغ عرضها سنوات ضوئية تنهار لتتحول إلى نجم يبلغ عرضه مليون كيلومتر فقط. رياضياً، ينبغي أن يدور ذلك النجم بسرعة كبيرة لدرجة أنه سيتفكك ويتناثر قبل فترة طويلة من اشتعاله. ومع ذلك، فإن معظم النجوم تدور على مهل تام. أين يذهب كل ذلك «الدوران»؟ نحن نشبهه في أن المجالات المغناطيسية تعمل كمكبج عظيم، مما يُبْطِئ دوران النجم على نفسه أثناء تشكله، لكن الآلية الدقيقة لا تزال صورة ضبابية. نحن نرى النتيجة، لكن العملية مخفية في الظلام.

الأسلاف المفقودون

الأكثر غموضاً هي «النجوم الأولى»، أو ما يسمى بنجوم الجبهة الثالثة (Population III). كان هؤلاء هم الرواد الحقيقيون الذين ولدوا من الهيدروجين النقي والهيليوم اللذين خلفهما الانفجار العظيم. ونظراً لافتقارهم إلى «المعادن» (المصطلح الفلكي لأي عنصر أثقل من الهيليوم)،

تخيل متزلجاً على الجليد يدور حول نفسه. عندما يضم ذراعيه إلى الداخل، فإنه يدور بشكل أسرع. الآن، تخيل سحابة غازية يبلغ عرضها سنوات ضوئية تنهار لتتحول إلى نجم يبلغ عرضه مليون كيلومتر فقط. رياضياً، ينبغي أن يدور ذلك النجم بسرعة كبيرة لدرجة أنه سيتفكك ويتناثر قبل فترة طويلة من اشتعاله. ومع ذلك، فإن معظم النجوم تدور على مهل تام. أين يذهب كل ذلك «الدوران»؟ نحن نشبهه في أن المجالات المغناطيسية تعمل كمكبج عظيم، مما يُبْطِئ دوران النجم على نفسه أثناء تشكله، لكن الآلية الدقيقة لا تزال صورة ضبابية. نحن نرى النتيجة، لكن العملية مخفية في الظلام.

لغز الاشتعال النووي الأول

غالباً ما نبدأ قصة النجم عند ولادته، لكن فترة «الحمل» هي المرحلة التي تكمن فيها أعماق الألغاز. في الرواية التقليدية، تنهار سحابة من الغاز تحت وطأة كتلتها حتى يصبح اللب حاراً بما يكفي لإشعال الهيدروجين. يبدو الأمر بسيطاً، لكن فيزياء هذا «النفس الأول» تنطوي على تناقض صارخ.

معضلة العزم الزاوي


كان لازماً أن يكونوا هائلين، مئات أضعاف كتلة شمسنا. لقد عاشوا بسرعة وماتوا في انفجارات مذهلة، وبذروا الكون بأولى ذرات الأكسجين والحديد. مع ذلك، وعلى الرغم من استعمال أقوى تلسكوباتنا، لم نرأياً منها قط. إنها «الحلقة المفقودة» في الكون. وإلى أن نجد بصماتها الكيميائية، يظل الفصل الأول من تاريخ الكون مجرد قصة أشباح.

حديقة الأجرام العنيفة: الفيزياء في أقصى حدودها

بينما يتعامل مخطط هرتزسبرونغ-راسل (H-R diagram) (وهو خارطة طريق التطور النجمي) مع النجوم «الطبيعية» بشكل جيد، فإننا نجد ساكنين في الحديقة النجمية لا يتناسبون مع القالب. هذه نجوم ولدت في بيئات قاسية تدفع المادة إلى نقطة انهيارها.

النجوم المغناطيسية (Magnetars): أقوى مغناطيسات الكون

يعد النجم النيوتروني في حد ذاته معجزة فيزيائية، فهو كرة بحجم مدينة تحتوي على كتلة تفوق كتلة الشمس. لكن النجم المغناطيسي هو نجم نيوتروني مضخم. فهو يمتلك مجالات مغناطيسية أقوى بمليون مليار مرة من مجال الأرض. إذا كان هناك نجم مغناطيسي يقع في منتصف الطريق إلى القمر، فإن مجاله المغناطيسي سيمسح البيانات من كل بطاقة تأمين على وجه الأرض. هناك لغز آخر مرتبط بالمغناطيس وهو «الزلازل النجمية». فمن حين لآخر، تتشقق قشرة النجم المغناطيسي تحت الضغط المغناطيسي الهائل، وتطلق طاقة في جزء من الثانية تفوق ما تصدره



الشكل 2: اكتشاف أول ما يُعتقد أنه ماجنيتار قريب من ثقب أسود في مركز مجرة درب التبانة عام 2013، مما أتاح دراسة العلاقة بين هذين الجسمين المتطرفين.

Main Sequence Stars						
Spectral Type:	O	B	A	F	G	K
Temperature:	40 000K	20 000K	2800K	6500K	5700K	4500K
Radius (Sun=1):	10	5	1.7	1.8	1.0	0.8
Mass (Sun=1):	50	10	2.0	1.0	1.0	0.7
Luminosity (Sun=1):	100 000	1000	20	4	1.0	0.2
Lifetime (million yrs):	10	100	1000	3000	10 000	100 000
Abundance:	0.00001%	0.1%	0.1%	78%	3.6%	80%

Giant Stars	White Dwarfs	Supergiant Stars
Low mass stars near the end of their lives.	Dying remnant of an imploded star.	High mass stars near the end of their lives.
Spectral Type: Mainly G, K or M	Spectral Type: D	Spectral Type: O, B, A, F, G, K or M
Temperature: 3000 to 10000K	Temperature: Under 0.001K	Temperature: 4000 to 40000K
Radius (Sun=1): 10 to 50	Radius (Sun=1): Under 0.01	Radius (Sun=1): 30 to 500
Mass (Sun=1): 0.5 to 10	Mass (Sun=1): Under 0.01	Mass (Sun=1): 10 to 100
Luminosity (Sun=1): 500 to 1000	Luminosity (Sun=1): Under 0.001	Luminosity (Sun=1): 30 000 to 1000 000
Lifetime (million yrs): 100-500	Lifetime (million yrs): 5%	Lifetime (million yrs): 1/10
Abundance: 0.4%	Abundance:	Abundance: 0.00001%

الشكل 1: تصنيف النجوم «الكلاسيكية»

وهي أسطع الظواهر الكهرومغناطيسية في الكون. للغز؟ لا نعرف بالضبط ما هو «المحرك» الذي يزود هذه التدفقات بالطاقة. هل هو دوران الثقب الأسود على نفسه، أم مفعول المَحَقْن مغناطيسي؟

النجوم الكواركية وما وراءها (Quark Stars)


لعل القفص الأكثر إثارة في الحديقة النجمية هو ذلك المخصص لـ «النجوم الكواركية الغريبة». في النجم العادي، توجد ذرات وفي النجم النيوتروني، تكون الجاذبية قوية جداً لدرجة أنها تسحق الإلكترونات داخل البروتونات، ولا يتبقى سوى النيوترونات. ولكن ماذا لو استمر الضغط أبعد

الشمس في 250 ألف عام. ما زلنا نحاول فهم كيف تتصرف المادة عندما تضغط بفعل الجاذبية وتُسحب بواسطة مثل هذه المغناطيسية المستحيلة في وقت واحد.

المستعرات العظمى الفائقة (Hypernovae):

كنا نعتقد أن المستعرات العظمى (Supernovae) هي الانفجارات النهائية. ثم وجدنا المستعرات العظمى الفائقة التي تحدث عندما ينهار نجم هائل الكتلة بحيث لا ينفجر وحسب؛ بل ينهار إلى ثقب أسود ويطلق نفاثين متقابلين من البلازما عبر الكون بسرعة تقترب من سرعة الضوء. إنها مصادر انفجارات أشعة غاما الطويلة (Long Gamma Rays Bursts)،

نجوم الكوارك والنجوم الغريبة



تحول المادة تحت الضغط الهائل

الكثافة النموذجية:

$$\rho_c \geq 5 - 10 \rho_{nuc}$$

$$(\rho_{nuc} \approx 2.7 \times 10^{14} \text{ g cm}^{-3})$$

في هذه الظروف قد تتحول إلى كوارك غلوون بلازما (QGP) أو مادة كواركية غريبة مستقرة (QCD)

الشكل 3: رسم تخطيطي يوضح البنية الداخلية المفترضة لنجم كواركي، من القشرة الخارجية الغنية بالأيونات والنيوترونات إلى المادة الكواركية فائقة الكثافة في أعماقه..

من ذلك؟ يقترح بعض الفيزيائيين أن النيوترونات نفسها «تتحلل» في حساء من الكواركات العلوية والسفلية والغريبة. يؤدي هذا إلى «فرضية المادة الغريبة» من Bodmer-Witten: الفكرة القائلة بأن «المادة الغريبة» قد تكون الحالة الأكثر استقراراً للمادة في الكون. إذا كان هذا صحيحاً، فقد يتحول النجم النيوتروني إلى نجم كواركي. والأكثر رعباً، أنه إذا لمست قطعة واحدة من المادة الغريبة ذرة عادية، فقد تُحوَّل تلك الذرة إلى مادة غريبة أيضاً، تماماً كالعدوى الكونية. وإذا كانت هذه النجوم موجودة، فهي تبدو تماماً كالنجوم النيوترونية.

مفارقة المستعر الأعظم: الانفجار الذي يتعثر

لعل القفص الأكثر إثارة في الحديقة النجمية هو ذلك المخصص لـ «النجوم الكواركية الغريبة». في النجم العادي، توجد ذرات وفي النجم النيوتروني، تكون الجاذبية قوية جداً لدرجة أنها تسحق الإلكترونات داخل البروتونات، ولا يتبقى سوى النيوترونات. ولكن ماذا لو استمر الضغط أبعد من ذلك؟ يقترح بعض الفيزيائيين أن النيوترونات نفسها «تتحلل» في حساء من الكواركات العلوية والسفلية والغريبة. يؤدي هذا إلى «فرضية المادة الغريبة» من Bodmer-Witten: الفكرة القائلة بأن «المادة الغريبة» قد تكون الحالة الأكثر استقراراً للمادة في الكون. إذا كان هذا صحيحاً، فقد يتحول النجم النيوتروني إلى نجم كواركي. والأكثر رعباً، أنه إذا لمست قطعة واحدة من المادة الغريبة ذرة عادية، فقد تُحوَّل تلك الذرة إلى مادة غريبة أيضاً، تماماً كالعدوى الكونية. وإذا كانت هذه النجوم موجودة، فهي تبدو تماماً كالنجوم النيوترونية.

رواق الأشباح: قاطنو الكون المستترون

أخيراً، يجب أن نتحدث عن النجوم التي لا يمكننا رؤيتها. إنها الأعضاء «المظلمة» في العائلة، وهي مصنوعة من مواد لا تتفاعل مع الضوء.

النجوم المظلمة وقودها الإفناء الجسيمي:

كشفت البيانات الحديثة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) عن «نقاط حمراء

صغيرة» (Little Red Dots) غامضة في الكون المبكر (انظر العدد 09 من مجلة الشهاب حول المجرات). يعتقد بعض العلماء أن هذه نجوم مظلمة. هي ليست مصنوعة من مادة مظلمة، لكنها تتغذى منها. في الكون المبكر، كانت المادة المظلمة كثيفة جداً لدرجة أنه كان يمكن احتجازها داخل النجوم التي كانت في طور التشكل. وعندما كانت جسيمات المادة المظلمة تفني بعضها البعض، كانت توفر الحرارة لإبقاء النجم متوهجاً. ستكون هذه النجوم هائلة، وباردة، ومنمتخة، على عكس أي شيء في سمائنا الحديثة.

نجم الأكسيوني (Axion star):

الشمس الشفافة

إذا كانت المادة المظلمة تتكون من جسيم يُسمى الأكسيون (Axion)، وهو جسيم دقيق افتراضي ابتُكر لتفسير بعض الخواص الرياضية للقوة النووية الشديدة، فإنها قد تشكل نجوماً بوزونية نسبة إلى أنها متكونة من جسيمات بوزونية ذات سبين (Spin) عدد صحيح مثل الأكسيون على خلاف النجوم العادية المتكونة من فرميونات مثل البروتون والنيوترون. ستكون هذه النجوم في جوهرها عبارة عن متكثفات بوز-آينشتاين (Bose-Einstein condensates) عملاقة، وهي حالة للمادة في الميكانيكا الإحصائية تتصرف فيها مليارات الجسيمات كحالة كمومية واحدة. ولأنها لا تتفاعل مع الضوء، فهي غير مرئية. مع ذلك، فإنها تمتلك كتلة، وبالتالي يمكن أن تتكتل معاً بفعل الجاذبية لتشكل نجماً يمر الضوء من خلاله مباشرة.

يمكنك الدوران في مدار حول هذا النجم الأكسيوني- البوزوني، لكنك لن تراه أبداً، ولن يمدك هذا النجم بأي دفء. يمكنك أيضاً الدخول بمركبة فضائية عبر نجم أكسيوني كهذا ورؤية النجوم العادية البعيدة على الجانب الآخر منها، رغم أنك ستشعر بجاذبيته الهائلة. هذه «النجوم البوزونية»، غير المرئية لأعيننا، ستعمل أيضاً كـ«مقلّدات للثقوب السوداء (Black Hole Mimickers)، حيث تقوم بتشويه ضوء المجرات البعيدة الواقعة خلفها مثل العدسات الجاذبية.

عوالم في الظلال

فيما يلي المزيد من الحالات النجمية غير الاعتيادية: الحالتان الأوليان تتدرجان في إطار الفيزياء العادية، بينما تمثل الحالات الأخرى احتمالات أكثر تخميناً وغرابة.


كواكب النجوم النابضة (Brown Dwarfs):

لقد وجدنا بالفعل كواكب تدور حول نجوم نيوترونية ميتة. ومع ذلك، فإن الحياة هناك ستكون شبه مستحيلة، حيث أن الكوكب سيكون مغمساً باستمرار بإشعاع قاتل.

الأقزام البنية (Brown Dwarfs):

هي «نجوم فاشلة» تتغذى لفترة وجيزة على الدوتيريوم، وهي باردة بما يكفي لتمكين كواكبها من الدوران في مدارات قريبة جداً منها. هذا «وميض الدوتيريوم (Deuterium flicker)» هو عملية اندماج نووي منخفضة الحرارة توفر فترة دفء قصيرة تمتد لعشرات الملايين من

النجوم المظلمة والنجوم البوزونية



نجم مظلم يُكشف عبر عدسة الجاذبية

الشكل 5: تصوّر في لنجمٍ مظلم تكشفه ظاهرة عدسة الجاذبية، حيث ينحني ضوء النجوم المحيطة بفعل جاذبيته.

تعرض أحد النجمين الثنائيين في مثل هذا النظام لانفجار مستعر أعظم (Supernova)، فإنه سيخلّف وراءه نجماً نيوترونياً؛ وقد يمنح هذا الانفجار النجمي الهائل النجم النيوتروني المتبقي «دفعاً قوية» في اتجاه جاره العملاق، مما يجبر الاثنين على التصادم والاندماج. هذا التركيب الغريب المتمثل في «نجم داخل نجم» والذي اقترحه عالم الفيزياء الحائز على جائزة نوبل كيب ثورن وآنا زيتكوف عام 1977، لا يزال فرضية غير مثبتة.

النجم الكهروضعيف ومحركه بحجم


التفاحة (Electroweak star):

هو «زر توقف مؤقت» كوني نظري يمنع تشكل الثقب الأسود مؤقتاً. فعندما يموت نجم هائل الكتلة، تسحق الجاذبية له بقوة هائلة تؤدي إلى تحلل النيوترونات إلى لبناتها دون الذرية وهي الكواركات. ومن خلال عملية «انتقال السيفاليرون» (Sphaleron transition) المتوقعة في نموذج «واينبرغ-سلام» للتفاعل الكهروضعيف، تُدْمَر هذه الكواركات وتتحول إلى نيترينوهات، مما يطلق كمية هائلة من الطاقة تصل معها درجات الحرارة إلى حدود 1015 كلفن. تحدث هذه العملية في جيب صغير بحجم التفاحة في المركز، يحمل كتلة أرضين تقريباً، وهو المكان الذي يتجلى فيه مقياس استعادة التناظر للتفاعلات الضعيفة (حوالي 100GeV). ويوازن الضغط الخارجي الناتج عن تدفق النيوترونات

السنين قبل أن يبرد الجرم الكوني إلى الأبد. وبناءً على ذلك، بدأنا نكتشف أن العديد من الكواكب الأكثر إثارة للاهتمام في جوارنا الكوني قد تكون في الواقع تدور حول هذه الأجرام الباهتة والمستترة بالأشعة تحت الحمراء، والتي تمثل «منطقة وسطى» بين النجوم والكواكب. أما الجانب الأكثر غرابة في هذه الأجرام فيتجلى في الأقزام البنية الأكثر حرارة من الفئة L ، حيث تكون درجات الحرارة مناسبة لتكثف المعادن، مما يشكل سحباً سميكة شاهقة الارتفاع تمطر حرقاً حديداً سائلاً وصخوراً منصهرة.

جرم ثورن-زيتكوف (-Thorne Žytkow object):

هو نجم هجين نظري يشبه في تركيبه دمية المتريوشكا الروسية الكونية، ويتشكل عندما يبتلع نجم عملاق أحمر ضخّم ومنمتفخ نجماً نيوترونياً صغيراً فائق الكثافة بالكامل. وبدلاً من أن يُدْمَر النجم النيوتروني (الذي يعادل حجمه حجم مدينة)، فإنه يستقر في مركز مضيقه العملاق، ليعيش داخله كطفيلي كوني. وإذا



الشكل 6: رسم افتراضي لـ Gravastar، وهو بديل افتراضي للثقوب السوداء يتكون من غلاف رقيق يحيط بفرغ من الطاقة المظلمة.

الجاذبية تماماً، مما يمنح النجم عمراً إضافياً يصل إلى 10 ملايين سنة قبل أن ينفد وقوده في النهاية وينهار متحولاً إلى ثقب أسود.


نجوم الجرافاستارز (Gravastars):

نجم تكثف فراغي ثقالي (Gravitational Vacuum Condensate Star) وهو بديل نظري للثقوب السوداء، مصمم لتجنب الانهيار الرياضي المتمثل في الكثافة اللانهائية (التفرد). وبدلاً من أن يسحق النجم المحتضر نفسه في نقطة واحدة، فإنه يمر بمرحلة انتقال طوري (Phase transition) ليتحول إلى فقاعة كونية مجوفة. يحتوي اللب على رقعة من الطاقة المظلمة (Dark Matter) التي تُحدث ضغطاً يوازن الجاذبية بشكل تام. وتظل هذه الطاقة محتواة بواسطة قشرة مادية رقيقة للغاية وعالية الكثافة من المادة العادية في الخارج. بناءً على ذلك، يظل انهيار نجم ثقيل إلى ثقب أسود هو النظرية الأكثر تفضيلاً بكثير. ومن مسافة بعيدة، يكون جذبها الثقالي مطابقاً تماماً لجذب الثقب الأسود، لكنها تفتقر تماماً إلى أفق الحدث (Event horizon) أو إلى مركز مسحوق بشكل لانهائي. ومع ذلك، فهي تظل نظرية هامشية، لا سيما بعد أن ثبت أنها تواجه مشكلة في الاستقرار في حالة الدوران على نفسه.

الثقوب البيضاء (White Holes):

الثقب الأبيض هو النقيض الرياضي التام للثقب الأسود؛ فهو جرم كوني يطرد المادة والضوء بعنف، ولا يمكن لأي شيء على الإطلاق أن يدخله. ورغم أنها كانت تُعتبر في الماضي مجرد شذوذ رياضي في النظرية النسبية العامة، إلا أن بعض نظريات الكم الحديثة تشير إلى أن الثقوب السوداء قد «ترتد» في النهاية وتتحول إلى ثقوب بيضاء في المراحل الأخيرة جداً من حياتها.

كلما تعمق فهمنا لكيفية تطور النجوم، أصبح من الواضح أن ما نعتبره نجوماً «قياسية» ما هي إلا سكان هادئون في كون أكثر تنوعاً. نحن نجد أنفسنا في عصر مثير للاستكشاف. فيفضل المرصد الجديدة، تكشف ببطء عن تعقيدات هذه الأغلاز السماوية. تشير اكتشافاتنا إلى وجود «فيزياء جديدة» منقوشة بين النجوم، من النجوم «المظلمة» الغامضة التي ربما كانت موجودة في الكون المبكر، إلى المغناطيسية الاستثنائية التي تظهرها النجوم المغناطيسية، لتؤكد أن معرفتنا الحالية لا تزال في مهدها.




الشكل 6: تصوّر فنيّ لبقايا مستعرٍ أعظم Pa 30، خلّفها انفجارٌ مستعرٍ أعظم شوهد عام 1181م. تمتدّ خيوطٌ غير اعتيادية من الكبريت إلى ما وراء غلافٍ غباريّ مكوّن من المادة التي قذفها الانفجار.

تتجاوز سرعتها 16.000 كم/ثا، أي نحو 5% من سرعة الضوء. تتفاعل هذه الرياح مع المواد المقذوفة المحيطة لتنتج الشكل المميز للسديم. ويُعتقد أن كتلة هذا القزم الأبيض تتجاوز حد شاندراسيخار أي «حد شاندر» The Chandrasekhar limit، وهو الحد النظري الأقصى الذي يستطيع القزم الأبيض تحمله قبل أن يصبح غير مستقر، وتبلغ قيمته نحو 1.4 مرة كتلة الشمس.

لماذا يبدو Pa 30 مختلفاً؟

تُعدّ الخيوط الطويلة المستقيمة الممتدة من مركز السديم أكثر سماته غرابة. فمعظم بقايا المستعرات العظمى، مثل سديم السرطان، تمتلك بنية مضطربة ومكتلة. أما Pa 30 فيشبه إلى حد بعيد زهرة الهندباء أو الألعاب النارية المتجمدة.

يكمن السبب في الفرق الكبير في الكثافة بين الرياح النجمية السريعة والوسط المحيط الرقيق. فعندما يندفع وسط كثيف داخل وسط أخف تتشكل بروتات إصبعية تُعرف بعدم استقرار رايلى-تايلور (Rayleigh-Taylor instabilities). وفي معظم الحالات تتمزق هذه البنية لاحقاً بفعل اضطرابات أخرى، لكن الظروف الفيزيائية الخاصة في Pa 30 سمحت لها بالبقاء مستقيمة ومحافطة على شكلها لقرون. وقد قدمت دراسة نُشرت عام 2025 تفسيراً هيدروديناميكياً لهذا المظهر الفريد.




الشكل 3: صور متعددة الأطوال الموجية لبقايا المستعر Pa 30 التقطها مرصد WISE والرصد البصري، تُظهر السديم المحيط بالنجم المركزي وتبرز اختلاف مظهره باختلاف الطول الموجي المستخدم في الرصد.

السديم يقارب 850 عاماً، في تطابق لافت مع حدث عام 1181. وللمقارنة، لا تتجاوز درجة حرارة سطح الشمس نحو 5800 كلفن، مما يجعل هذه الحرارة الاستثنائية دليلاً على حدث عنيف وقع في الماضي القريب نسبياً.

نوع نادر من المستعرات العظمى


أظهرت الدراسات أن Pa 30 لا يشبه بقايا المستعرات العظمى الاعتيادية (SN remnant). ففي المستعر الأعظم من النوع Ia يُدْمَر القزم الأبيض بالكامل نتيجة نتيجة انفجار حراري نووي جامح. والقزم الأبيض هو المصير النهائي لمعظم النجوم متوسطة الكتلة، ومنها شمسنا، بعد أن تستنفد وقودها النووي. ورغم أن حجمه يقارب حجم الأرض، فإنه يحتوي على كتلة تقارب كتلة الشمس.

أما في حالة Pa 30، فقد نجا القزم الأبيض من الانفجار، مما يشير إلى فئة نادرة تُعرف بالمستعرات العظمى من النوع Iax، ويُعتقد أن هذا النوع ينشأ من اندماج قزمين أبيضين يدوران حول بعضهما البعض. ومع مرور الزمن يفقد هذان الجرمان الطاقة الحركية المدارية تدريجياً عبر إصدار موجات ثقالية، فيقتربان شيئاً فشيئاً



الشكل 5: السديم Pa 30، ويُعتقد أن النقطة الزرقاء في مركزه هي «نجم زومبي» (قزم أبيض نجا من مستعر أعظم نادر من النوع Iax عام 1181م).

النجم المركزي ل Pa 30، المعروف أيضاً باسم «نجم باركر» Parker star، يطلق رياحاً نجمية




الشكل 4: يوضّح هذا التسلسل المراحل المتوقعة لاندماج قزمين أبيضين نتيجة فقدان الطاقة عبر إصدار الموجات الثقالية. ومع اقترابهما واندماجهما يحدث انفجار حراري نووي جزئي من النوع Iax، لا يدمّر النجم بالكامل، بل يخلف بقايا نجمية فائقة الكتلة تُعرف أحياناً باسم «النجم الزومبي»، كما يُعتقد أنه حدث في السديم Pa 30.

قصة الجرم السماوي Pa 30

حلّ لغز عمره 850 عاماً

Pa 30: Solving an 850-Year-Old Mystery



الشكل 1: صور متعددة الأطوال الموجية لبقايا المستعر Pa 30، تُظهر البنية الغازية المحيطة بالنجم المركزي الذي يُعتقد أنه نجا من انفجار مستعر أعظم نادر وقع عام 1181م.

بقلم د. جمال ميموني

وحدة البحث في الوساطة العلمية - CERIST




المجردة. نعرف اليوم أن مثل هذه الظواهر هي مستعرات عظمى، أي انفجارات نجمية هائلة قد تتفوق مؤقتاً في سطوعها على مجرات بأكملها. يُطلق اسم «المستعر الأعظم» على الانفجار النهائي لبعض النجوم. وتوجد فئتان رئيسيتان من هذه الأحداث: المستعرات العظمى من النوع Ia، الناتجة عن انهيار النجوم فائقة الكتلة عند نفاد وقودها النووي، والمستعرات العظمى من النوع Ia، الناتجة عن انفجار قزم أبيض غير مستقر. لكن رغم دقة السجلات التاريخية، لم يتمكن العلماء طويلاً من العثور على البقايا التي خلفها ذلك الحدث.

لا شيء أنسب لاختتام هذا الملف عن العالم النجمي، من سرد هذه القصة التي تروي كيف حلّ لغزٌ حيرّ الناس طويلاً. كما ستمنحنا فرصة للعودة إلى بعض الموضوعات التي تناولناها من قبل، ومن بينها المصائر المختلفة التي قد تنتهي إليها النجوم. لأكثر من ثمانية قرون ونصف، ظلّ مدخلٌ وحيثُ في السجلات الفلكية الوسيطة عصياً على التفسير. ففي صيف عام 1181م، دوّن مراقبو السماء في الصين واليابان بشكل مستقل ظهور «نجم ضيف» في كوكبة ذات الكرسي. كان ساطعاً مثل كوكب المشتري، ومكث 185 يوماً قبل أن يختفي عن الرؤية بالعين

اكتشاف غير متوقع

لعقود، اعتُبر السديم الراديوي 3C58 المرشح الأبرز لبقايا مستعر 1181، لأنه يحتوي على نجم نيوتروني نابض. والنجم النيوتروني هو بقايا نجم فائق الكتلة انهار تحت تأثير جاذبيته بعد انفجار مستعر أعظم من النوع II، وتُضغَط كتلته الهائلة في كرة لا يتجاوز قطرها بضع عشرات من الكيلومترات. أما النباض فهو نجم نيوتروني سريع الدوران يرسل حُزم إشعاع دورية تشبه منارة كونية. لكن قياسات تباطؤ دوران هذا النباض

أشارت إلى عمر يبلغ عدة آلاف من السنين، أي أكبر بكثير من 850 عاماً. وهكذا استُبعد هذا المرشح وعاد الغموض من جديد. في عام 2013، اكتشف عالم الفلك الهاوي دانا باتشيك جرماً خافتاً دائرياً في بيانات الأشعة تحت الحمراء التابعة للمسح WISE. سُجِّل الجرم باسم Pa 30 وصُنِّف مبدئياً كسديم كوكبي عادي. لكن القياسات اللاحقة كشفت مفاجأة، نجم مركزي تبلغ حرارته نحو 200.000 كلفن، وخيوط غازية تتمدد بسرعة تقارب 1100 كم/ثا. عند تتبع هذا التمدد إلى الوراء، تبين أن عمر



الشكل 2: صورة بالأشعة السينية لبقايا المستعر 3C 58 التقطها مرصد تشاندر، مع تكبير يُظهر النجم النيوتروني في المركز والسديم المحيط به الناتج عن الانفجار النجمي.

ضيف العدد

يورغن كريستنسن-دالسغارد

الفاكي الذي علمنا كيف نستمع إلى النجوم

Jørgen Christensen-Dalsgaard

The Astronomer Who
Taught Us to Listen

أجرى الحوار: د. جمال ميموني

نبذة عن الضيف

يورغن كريستنسن-دالسغارد هو عالم فيزياء فلكية دنماركي، يُعد أحد أبرز رواد علم زلازل النجوم وعلم الزلازل الشمسية. يشغل حالياً منصب أستاذ فخري بجامعة آرهوس، وقد تركزت أبحاثه على دراسة البنية الداخلية للشمس والنجوم من خلال تحليل التذبذبات الطبيعية على أسطحها، وقد أسهمت أبحاثه في إحداث نقلة نوعية في فهم تركيب النجوم وأعمارها وتطورها.

شارك ضيفنا في عدد من أهم المشاريع الفضائية الدولية، من خلال عضويته في مجموعات عمل تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، والمرصد الأوروبي الجنوبي، كما كان باحثاً مشاركاً في مهمة تلسكوب كبلر الفضائي، وترأس اتحاد كبلر لعلوم زلازل النجوم الذي استثمر بيانات التلسكوب لدراسة آلاف النجوم والكشف عن خصائصها الداخلية بدقة غير مسبوقة.

Guest Biography


Dr. Jørgen Christensen-Dalsgaard is a Danish astrophysicist and astronomer, widely regarded as one of the most prominent pioneers in the fields of asteroseismology and helioseismology. He currently holds the position of Professor Emeritus at Aarhus University. His research has focused on studying the internal structure of the Sun and other stars by analyzing the natural oscillations on their surfaces. These studies have led to a major breakthrough in our understanding of the composition, ages, and evolution of stars.

Our guest has participated in several major international space projects through his membership in working groups for the National Aeronautics and Space Administration (NASA), the European Space Agency (ESA), and the European Southern Observatory (ESO). He also served as a Co-Investigator for the Kepler space telescope mission and headed the Kepler Asteroseismic Science Consortium (KASC), which utilized the telescope's data to study thousands of stars and reveal their internal properties with unprecedented precision.

خطاً كسديم كوكبي عادي. ولم تتضح طبيعته الحقيقية إلا بعد الجمع بين الملاحظات الهوائية، والبيانات الأرشفية، والقياسات الطيفية الدقيقة، مما يذكرنا بأن التقدم العلمي لا يقوم فقط على تأكيد الفرضيات، بل أيضاً على مراجعتها والتخلي عنها عندما تفرض الأدلة ذلك.

لم يكن «المستعر الأعظم غريب الشكل» الذي ظهر عام 1181 شذوذاً فلكياً، بل اكتشافاً مهماً. فقد أدى التعرف على طبيعته الحقيقية إلى إعادة النظر في النتائج الممكنة لاندماج الأقزام البيضاء، وأبرز أهمية المستعرات العظمى النادرة من النوع Iax. وعلى نطاق أوسع، تُظهر هذه القضية أن التقدم العلمي نادراً ما يكون خطياً؛ فهو ثمرة مسارات خاطئة، وإعادة فحص للأدلة، وتقارب تدريجي للقارئ المبعثرة عبر القرون.

ويتميّز Pa 30 بأنه يجمع بين الجمال والعلم والتاريخ في جرم واحد. فبنيت الشعاعية المدهشة تكاد تكون فريدة بين بقايا المستعرات العظمى المعروفة؛ ومن الناحية العلمية، يُعد أحد أفضل المختبرات الطبيعية لدراسة انفجارات النوع Iax و«النجوم الزومبية» التي قد تنجو منها؛ أما من الناحية التاريخية، فهو البقايا التي خلفها المستعر الأعظم المرصود عام 1181م. وبعد أن اعتُبر زمناً طويلاً مجرد سديم كوكبي عادي، أصبح اليوم شاهداً على أن الكون لا يزال يحتفظ بالكثير من المفاجآت.



الشكل 7: يتشوّ الغاز المتمدّد في سديم السرطان بفعل الاضطرابات الهيدروديناميكية، مما يمنحه المظهر الفوضوي والمتكتل المميز لمعظم بقايا المستعرات العظمى. على النقيض من ذلك، يتميز Pa 30 بتباين كبير جداً في الكثافة، مما يسمح ببقاء خيوطه الطويلة والمستقيمة محفوظة على مدى آلاف السنين.

نماذج متوقعة مسبقاً، إلى ربط مستعر 1181 بمرشح بدا مقنعاً في البداية، كما أن المظهر الدائري المنتظم نسبياً لـ Pa 30 جعله يُصنّف

انفجار آخر في المستقبل؟


يبدو أن القزم الأبيض الناجي غير مستقر تماماً. فكتلته تتجاوز حد شاندراسيخار، ويُرجّح أن استقراره الحالي يعتمد على دورانه السريع حول نفسه وعلى الطاقة المبددة عن العناصر المشعة التي خلفها الانفجار الأول. وتشير النماذج إلى أنه قد يتعرض لانفجار حراري نووي ثانٍ خلال نحو عشرة آلاف سنة. ولن يشكل ذلك خطراً على الأرض نظراً لبعده عنا (حوالي 7.500 سنة ضوئية)، لكنه قد يمثل الفصل الثاني من قصة بدأت في أواخر القرن الثاني عشر.

والتفاعلات الحرارية النووية هي نفسها التفاعلات التي تزود النجوم بالطاقة طوال حياتها. غير أنها داخل الأقزام البيضاء الشديدة الانضغاط قد تتحول من احتراق مستقر إلى انفجار كارثي خلال فترة قصيرة جداً.

لماذا استغرق حل اللغز كل هذا

الوقت؟

تكشف قصة Pa 30 عن بعض الصعوبات الشائعة في البحث العلمي. فقد أدى التركيز على



الشكل 8: صورة عميقة للسديم Pa 30 التُقطت بمرشح ضيق النطاق يُبرز انبعاثات الكبريت، كاشفةً خيوطاً شعاعية دقيقة تمتد من المركز، وهي بنية غير مألوفة في بقايا المستعرات العظمى وتوفر أدلة مهمة على طبيعة الانفجار الذي شكل السديم.




الشكل 1: تصوّر الإنسان منذ العصور القديمة أن النجوم نقاط مضيئة مثبتة على قبة سماوية تحيط بالأرض. وظل هذا التصور سائدا لقرون، حتى كشفت المراصد الحديثة أن النجوم شمس بعيدة تفصلنا عنها مسافات هائلة.

على الرصد حيث تدور الشمس حول الأرض بدلاً من ذلك. ثم جاء جيوردانو برونو Giordano Bruno، الذي وضع نظرية تنبؤية مفادها أن النجوم كانت شمساً يمكن أن تستضيف كواكبها الخاصة، وربما حق الحياة. وبطبيعة الحال، كان هذا أمراً غير مقبول بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ولهذا السبب تم إحراقه بشكل مأساوي على الوتد.

وصلت الثورة العلمية الحقيقية عندما سمح التحليل الطيفي لعلماء الفلك بتحديد أن النجوم تحتوي على نفس العناصر الكيميائية الموجودة في شمسنا تماماً. وبحلول القرن التاسع عشر، نجح العلماء أخيراً أيضاً في قياس اختلاف المنظر النجمي. سمح لهم هذا الاختراق بحساب مسافات دقيقة، ورسم خريطة لهيكل مجرة درب التبانة، وبناء النماذج الفيزيائية التأسيسية الأولى للنجوم، وكذلك المعروفة باسم «البوليتروب» Polytrops .

لنتقل إلى أوائل القرن العشرين، وهو الوقت الذي كان فيه العلماء لا يزالون يحاولون تحديد المصدر الحقيقي للطاقة النجمية. من اللافت للنظر أنه على الرغم من تطورات العصر في الفيزياء الحديثة - مثل الكهرومغناطيسية، والفيزياء الذرية، وأعمال ماكسويل وأينشتاين - ظلت الآلية الفعلية التي تزود النجوم بالطاقة مجهولة حتى ثلاثينيات القرن العشرين مع ظهور الفيزياء النووية. أليس من المدهش أن هذه الآلية الأساسية ظلت لغزاً طيلة هذه الفترة الطويلة؟



الشكل 2: يُقاس اختلاف المنظر النجمي (Parallax) من خلال رصد الموقع الظاهري للنجم في أوقات مختلفة من السنة أثناء دوران الأرض حول الشمس، ويُعد هذا الأسلوب الأساس المباشر لقياس المسافات إلى النجوم القريبة.

أعتقد أنك غير منصف بعض الشيء تجاه آرثر إدينغتون A.Eddington ، الذي هو حقاً أحد أباطي العظماء. فقد امتلك إدينغتون في الواقع فهماً شبه كامل لفيزياء النجوم قبل أن تُفهم الفيزياء النووية بالكامل. لقد افترض أن الحرارة يمكن أن تنتج عن اندماج الهيدروجين لتكوين الهيليوم، على الرغم من أنه لم يدرك الآليات الدقيقة لذلك.

لقد فهم إدينغتون تماماً البنية الهيدروستاتيكية للنجوم، ووصفها بشكل جميل باستخدام نماذج البوليتروب. كما كان لديه فهم ممتاز لكيفية انتقال الطاقة عبر الإشعاع؛ فبحلول عام 1925، تم حساب معاملات الامتصاص الذي بدقة، مما سمح له بنمذجة انتقال الطاقة داخل النجوم. وقد مكّنه ذلك من التنبؤ بعلاقة الكتلة واللمعان دون الحاجة إلى معرفة مصدر الطاقة الدقيق. ما كان ينقصه هو القطعة الأخيرة من اللغز: التكوين النجمي. لقد افترض أن النجوم تتكون من مواد تشبه مواد الأرض، وكان ينبغي سترومجرين هو من أدرك لاحقاً أن النجوم تتكون في الغالب من الهيدروجين. أخيراً، جاء هانز بيته وآخرون في أواخر الثلاثينيات لشرح الآليات الفيزيائية المحددة للاندماج النووي.

هناك فجوة تاريخية رائعة هنا. دورة CNO (الكربون-النيتروجين-الأكسجين)، التي تهيمن على النجوم الأثقل، وصفها بيته



الشكل 4: أول كيلونوفا جرى رصدها مباشرة عام 2017، نتجت عن اندماج نجمين نيوترونيين. وقد أكد هذا الحدث أن مثل هذه الاصطدامات تُعد من أهم مواقع إنتاج العناصر الثقيلة في الكون عبر عملية الالتقاط السريع للنيوترونات (r-process).


الأساسية يصعب تحديدها بشكل لا يصدق. على عكس دورة CNO، لا يمكن قياس سلسلة p-p مباشرة في المختبر؛ بل يجب حسابها نظرياً، مما يتطلب فيزياء نووية شديدة التعقيد. وفيما يتعلق بالتفاعلات الفيزيائية، لا يمكن الفصل بينهما؛ كلاهما ضروري. فالتفاعل الضعيف يحدد المقياس الزمني عن طريق تحويل بروتون إلى نيوترون، بينما يبني التفاعل القوي فيزيائياً النوى الأثقل. لا يمكنك الادعاء بأن أحدهما وحده هو المسؤول. الأمر أشبه بإعداد الخبز، إذ لا يمكنك صنع الخبز بدون كل من الحبوب والحرارة.

اليوم، نحن نفهم أن العناصر تتشكل عبر التفاعلات النووية، وأن العديد من العناصر الثقيلة تتشكل أثناء المستعرات العظمى الناتجة عن انهيار نواة النجم. إلى أي مدى تبدو صورة التركيب النووي الانفجاري Explosive nucleosynthesis هذه راسخة؟

إن واقع التركيب النووي في النجوم معقد للغاية، فالنوى الذرية يتم إنتاجها أيضاً خلال التطور النجمي المبكر. تقوم النجوم الأكثر كتلة بدمج العناصر وصولاً إلى مجموعة الحديد، ونجم مثل الشمس لن يتقدم كثيراً بعد الكربون والأكسجين، تاركاً إياها حبيسة في قزم أبيض. النجوم الأثقل قليلاً تقذف هذه العناصر إلى الوسط بين

وفون فايتزساكر H.Bethe and C. von Weizacker، لكن الشمس تعتمد في المقام الأول على سلسلة البروتون-بروتون. لماذا تأخر فهم الآلية الخاصة بالشمس؟

التأخير فيما يتعلق بسلسلة البروتون-بروتون (p-p) ينبع من حقيقة أن معدلات تفاعلها



الشكل 3: البنية الداخلية للنجم، موضحةً النواة حيث يحدث الاندماج النووي، والمنطقة الإشعاعية، ومنطقة الحمل الحراري، وصولاً إلى الغلاف الضوئي والإكليل، اللذين يمثلان الأجزاء المرئية والخارجية للنجم.

الاتفاخ المجري. **كفكرة أخيرة، ماذا يخبر المستقبل لفيزياء النجوم وعلم اهتزاز النجوم؟**

المستقبل مشرق بشكل لا يصدق. حتى بالنسبة للشمس، لا نزال بحاجة إلى فهم دوران نواتها والطبقة الانتقالية الحاسمة التي تقود النشاط المغناطيسي الشمسي والبقع الشمسية. بالنسبة لعلم اهتزاز النجوم، فقد فاقت بيانات الرصد لدينا بكثير نماذجنا الفيزيائية؛ يجب علينا تحسين الفيزياء الأساسية لتتطابق مع ما نراه. نحتاج أيضاً إلى دمج دور المجالات المغناطيسية بشكل صحيح في التطور النجمي، وهو عامل تم إهماله إلى حد كبير. ستوفر مهمة PLATO الفضائية القادمة، إلى جانب شبكتنا العالمية من التلسكوبات الأرضية لعلم اهتزاز النجوم، القفزة الهائلة التالية إلى الأمام في هذا المجال.

شكراً جزيلاً لك يورغن. لقد غطينا رحلة علمية واسعة ورائعة، من التاريخ الفلكي المبكر إلى أحدث الاكتشافات. ستكون رؤاك قيمة للغاية للقراء.

شكراً لك. لقد كان من دواعي سروري.

بدلاً من ذلك على قياس التغيرات العالمية في الضوء أو السرعة الشعاعية (إزاحة دوبلر). لحسن الحظ، تخترق الموجات ذات الأطوال الموجية الطويلة عمق نواة النجم. يسمح لنا ذلك بتتبع تحول الهيدروجين إلى هيليوم، مما يمنحنا القدرة على قياس أعمار النجوم بدقة. بالنسبة للنجوم العملاقة الحمراء، يمكننا رصد موجات الجاذبية الداخلية الحساسة جداً لنواها المضغوطة.

هل أدى علم اهتزاز النجوم بشكل طبيعي إلى مشاركتك في أبحاث الكواكب الخارجية، وتحديدًا مهمة كبلر؟


نعم، المجالان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً. فبينما صُممت مهمة كبلر التابعة لناسا لاكتشاف الكواكب الخارجية، أدركنا أنها ستكون استثنائية لعمليات الرصد الاهتزازي للنجوم. لتوصيف كوكب خارجي بدقة، يجب عليك أن تفهم نجمه المضيف بشكل مطلق. يتيح لنا علم اهتزاز النجوم تحديد كتلة النجم ونصف قطره وعمره بدقة، مما يخبرنا بشكل مباشر عن الكواكب التي تدور حوله. يمكن لعلم اهتزاز النجوم حالياً استكشاف العملاقة الحمراء على بعد آلاف السنين الضوئية. ستسمح لنا المشاريع القادمة مثل تلسكوب رومان الفضائي بدراسة النجوم في

كنت طالب دكتوراه في كامبريدج عندما بدأت في حساب نماذج لكيفية اهتزاز الشمس. في عام 1975، نجح فرانز لودفيغ دوبيير في قياس حركات سطح الشمس، مقدماً أول دليل واضح على الاهتزازات الشمسية المنظمة. أدركت أنا ومشرفي أن قياس ترددات هذه الاهتزازات يمكن أن يكشف عن باطن الشمس العميق.

بحلول عام 1980، أثبتت بيانات استثنائية من مجموعة فرنسية تراقب من القطب الجنوبي صحة نماذجنا الشمسية. وبشكل حاسم، أثبت هذا أن النقص الشهير في النيوتريونات الشمسية المرصودة لم يكن بسبب نماذج نجمية معيبة، بل بسبب فجوة في فهمنا لفيزياء النيوتريو - مما أدى إلى اكتشاف تذبذبات النيوتريو. دفع هذا النجاح جهود رصد هائلة، بما في ذلك شبكة GONG والقمر الصناعي SOHO.

كيف تنتقل من علم الهيليوزلايات Heliosismology إلى علم اهتزاز النجوم Astrosismology ، لمراقبة النجوم البعيدة حيث لا يمكننا رؤية تفاصيل السطح؟

نظراً لأن النجوم البعيدة تظهر فقط كنقاط ضوئية، فإن الموجات السطحية ذات الأطوال الموجية القصيرة تلغي بعضها البعض رسدياً. نحن نعتمد



الشكل 7: تسلك الموجات الزلزالية داخل النجم مسارات مختلفة تبعاً لخصائص طبقاته الداخلية، مما يسمح باستنتاج بنيته الداخلية من خلال دراسة ترددات الاهتزاز.


الصدمة - مما يمكن أن تولده التفاعلات النووية وحدها، وهو ما يمزق النجم ويفجره. يختلف هذا تماماً عن المستعرات العظمى من النوع Ia، والتي تتضمن أقزاماً بيضاء في أنظمة ثنائية تراكم الكتلة حتى تنهار وتشتعل وتندمج في الغالب لتشكل عناصر مجموعة الحديد.

كان التحدي التاريخي يتمثل في شرح كيف يمكن للمستعرات العظمى أن تنتج ما يكفي من العناصر الأثقل، وهذا بالضبط هو السبب وراء ظهور الكيلونوفا كحل حاسم. فاندماج النجوم النيوترونية يوفر تدفقات النيوترونات الهائلة المطلوبة لالتقاط النيوترونات بكفاءة عالية.

على الرغم من الحواسيب الفائقة الحديثة، لا تزال نمذجة هذه المستعرات العظمى الناتجة عن انهيار النواة صعبة للغاية. لماذا لم نحل آلية انفجار المستعر الأعظم بعد؟

يكن التحدي الأساسي في الظواهر الديناميكية المعقدة وديناميكا السوائل المعنية، بدلاً من الفيزياء النووية والطبيعة غير متماثلة للانفجار إلى حد كبير. أثناء الانفجار، تختلط المادة وتنتقل الطاقة بشكل ديناميكي، مما يخلق اضطراباً شديداً تفشل النماذج المتناظرة كروياً في التقاطه. إذا لاحظت بقايا المستعرات العظمى مثل سديم السرطان، فسترى هياكل شديدة التعقيد وغير كروية، ومع زيادة قوة الحوسبة، أنا متفائل بأن نماذج أكثر واقعية ستنتج في محاكاة هذه الانفجارات.


دعنا ننتقل الآن إلى عملك الرائد في علم الهيليوزلايات، وهو مجال سمح لنا أخيراً بـ «الرؤية» داخل النجوم. كيف تطور هذا المفهوم الثوري؟



الشكل 5: تكشف الهيليوزلايات (علم الزلازل الشمسية) عن البنية الداخلية للشمس من خلال تحليل تذبذبات سطحها، مما يتيح رسم خرائط لسرعة انتقال الموجات الصوتية داخلها واستنتاج خصائص طبقاتها الداخلية بدقة عالية.

النجم يحتاج إلى ما بين 8 إلى 10 كتل شمسية ليصبح مستعراً أعظم. من المحتمل أن تكون خمس عشرة كتلة شمسية عالية جداً؛ النجوم بهذه الكتلة، أو التي تتجاوز ربما 20 إلى 25 كتلة شمسية، ستتهار على الأرجح مباشرة لتشكل ثقباً أسود.

في سيناريو انهيار النواة، يقوم النجم الضخم بدمج العناصر حتى يصل إلى مجموعة الحديد. المزيد من الاندماج يستهلك الطاقة بدلاً من إنتاجها، ثم تنهار النواة إلى كثافات نووية، مما يطلق طاقة أكبر بكثير - في المقام الأول عبر النيوتريونات وموجات



الشكل 6: أسهمت المراصد الشمسية الفضائية، مثل مرصد SOHO وغيره، في توفير رصد متواصل للشمس، مما مكن العلماء من دراسة اهتزازاتها الداخلية ونشاطها المغناطيسي والانفجارات الشمسية بدقة غير مسبوقة.

النجمي، وتشكل بعض العناصر الأثقل عبر التقاط النيوترونات خلال المراحل المتأخرة من النجوم متوسطة الكتلة. هذا الفهم التأسيسي لتفاعلات التقاط النيوترونات تم رسم معالمه إلى حد كبير من قبل الزوجين بوربيدج، وفاولر، وهويل E. M. Burbidge & G. R. Burbidge, W. A. Fowler, F. Hoyle في الخمسينيات.

ومع ذلك، بالنسبة للعناصر الأثقل، لا يزال هناك نقاش نشط حول ما إذا كانت الآلية الأساسية هي انفجارات المستعرات العظمى ذات النواة المنهارة أو اندماج النجوم النيوترونية - وهي ظاهرة تُعرف باسم الكيلونوفا Kilonova، حيث تنطوي الكيلونوفا على كميات هائلة من التقاط النيوترونات، مما يؤدي إلى تكوين العديد من العناصر الثقيلة. وقد تسارع هذا الموضوع بسرعة منذ أن تم رصد الكيلونوفا لأول مرة عبر موجات الجاذبية والتلسكوبات البصرية.


ما هو الحد الأدنى للكتلة المطلوبة لنجم كي يمر بانفجار مستعر أعظم ناتج عن انهيار النواة؟ بعض المصادر تقول 8 كتل شمسية، والبعض الآخر يشير إلى أنها تقترب من 15.

نظراً لتعقيد العمليات، من الصعب إعطاء إجابة دقيقة متفق عليها عالمياً، لكنني أقدر أن


تحدث في النجوم التي تتراوح كتلتها الأولية بين 8 إلى 10 كتل شمسية، مدفوعة بأسر الإلكترونات على أنوية المغنيسيوم والنيون في نواة شديدة التحلل. كما قدم نوموتو مفهوم «المستعرات الفائقة» (Hypernovae)، وهي أحداث انهيار نواة استثنائية الطاقة ($E \geq 10^{52}$ erg) مرتبطة بانفجارات أشعة غاما، مما يربط بشكل أساسي بين الكميات المنتجة للعناصر الثقيلة في التركيب النووي و طاقة الانفجار.

رسم خرائط التطور الكيميائي المجري

النجاح الباهر لعمل نوموتو و ووسلي هو تطبيقه على التطور الكيميائي المجري. فمن خلال حساب الوفرات (Abundances) النظرية الدقيقة لأنواع المستعرات العظمى المختلفة عبر كتل نجمية ونسب معدنية متباينة، قاما بإنشاء مجموعات البيانات التأسيسية المستخدمة لتفسير الأطياف الكيميائية للكون. عندما يكتشف الراصدون نجوماً قديمة تفتقر بشدة إلى المعادن في الهالة المجرية، فإنهم يعتمدون مباشرة على جداول الوفرات التي أنشأها نوموتو و ووسلي لاستنتاج خصائص الجيل الأول من النجوم «الجمهرة النجمية الثالثة» (Population III) التي أثرت الغاز البدائي. تؤكد نماذج هذين العالمين، أننا، بالمعنى الحرفي للكلمة، نتاج ثانوي لديناميكا المائبة النجمية.



الشكل 1: تراكم المادة على قزم أبيض يؤدي إلى انفجار مستعر أعظم نووي حراري من نوع SNIIa



الشكل 1: تراكم المادة على قزم أبيض يؤدي إلى انفجار مستعر أعظم نووي حراري من نوع SNIIa

ستانفورد ووسلي: أحدث ثورة في دراسة تطور النجوم الهائلة. تتبع نماذجه الشاملة النجوم منذ مرحلة حرق الهيدروجين في التسلسل الرئيسي (main-sequence) وصولاً إلى سلسلة مراحل الاحتراق المتقدمة (الكربون، النيون، الأكسجين، والسيليكون) حتى انهيار نواة الحديد. علاوة على ذلك، كان ووسلي رائداً في نموذج «المنهار» (Collapsar model)، الذي يفسر انفجارات أشعة غاما طويلة الأمد (GRBs) كنتيجة لانهيار نجم ضخم وسريع الدوران مباشرة إلى ثقب أسود، مما يدفع نفثات نسبية عالية الطاقة. **كينيتشي نوموتو:** وسّع تصنيف الموت النجمي. فقد حدد الآليات الكامنة وراء «مستعرات أسر الإلكترون العظمى» (Electron-capture supernovae) وهي فئة مميزة من الانفجارات

شاندراسيخار ($M \approx 1.4 M_{\odot}$)، تصل الكثافة المركزية إلى $\rho \approx 10^9 \text{ g/cm}^3$ ويشتعل الكربون. قام نوموتو و ووسلي بنمذجة دقيقة لانتشار جبهة الاحتراق النووي دون الصوتية عبر غاز الإلكترونات المتحلل للنجم. وأتاحت شبكات التفاعلات النووية المفصلة الخاصة بهما لعلماء الفيزياء الفلكية، التنبؤ بدقة بالكميات المنتجة من العناصر الثقيلة عن هذه الانفجارات. على سبيل المثال، تتبع نماذجهما بدقة سلاسل التحلل الإشعاعي التي تمد المنحني الضوئي للمستعر الأعظم بالطاقة، وتحديدًا تحلل النيكل-56 إلى الحديد-56. نظراً لأن المستعرات العظمى من النوع (Ia) تتمتع بذروة لمعان ثابتة، فإنها تُستخدم «كشموع قياسية» لقياس المسافات الكونية. قدمت



الأطر النظرية لنوموتو و ووسلي المبرر الفيزيائي الصارم الذي يحتاجه الراصدون لاستخدام هذه الانفجارات بثقة لاكتشاف التوسع المتسارع للكون.

انهيار النواة وتطرف الموت النجمي

إلى جانب الانفجارات النووية الحرارية، طوّر كلا الباحثين بشكل عميق معرفتنا بالمستعرات العظمى الناتجة عن انهيار النواة (Core-collapse Supernovae)، وهي النهايات الكارثية للنجوم الهائلة الكتلة ($M > 8 M_{\odot}$).



بقلم د. جمال ميموني

وحدة البحث في الوساطة العلمية - CERIST




ساهم هذان العالمان خلال عقود من الأبحاث المستقلة والمتكاملة إلى حد كبير، في تشكيل فهمنا الحديث للانفجارات النجمية والتركيب النووي المجري. وبينما نستكشف عالم النجوم وعلم الزلازل النجمية في هذا العدد من مجلة «الشهاب»، فإن عمل هذين الفائزين يقدم الخريطة النهائية لكيفية إنهاء النجوم لحياتها وبذر الكون بالعناصر الثقيلة. تجدر الإشارة بكل فخر إلى أن كاتب هذه السطور قد حظي بهذين العالمين كأستاذة له في مستهل دراساته للفيزياء الفلكية، وذلك خلال مرحلة زمالة ما بعد الدكتوراه التي أعقبت حصوله على شهادة الدكتوراه.

في حين أن الجوائز العلمية غالباً ما تُكرّم ثلاثياً من الباحثين، فإن جائزة شو (Shaw Prize) في علم الفلك لعام 2026 كُرّمت شخصيتين مؤسستين في مجال الفيزياء الفلكية النجمية. لقد مُنحت الجائزة، التي أُعلن عنها مؤخراً وسلط عليها الضوء الاتحاد الفلكي الدولي (IAU)، بالتساوي لكل من كينيتشي نوموتو (Ken'ichi Nomoto) من جامعة طوكيو، وستانفورد ووسلي (Stanford Woosley) من جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز.


أفران الكون

يشع المستعر الأعظم (Supernova) في غضون أيام قليلة، طاقة تعادل ما ستصدره الشمس طوال فترة حياتها البالغة 10 مليارات سنة. وبعيداً عن لمعانها الهائل، تُعد هذه الانفجارات البوتقات الأساسية للكيمياء الكونية؛ فهي تدفع ديناميكيات الغاز بين النجمي، وتولد الأشعة الكونية، وتصره العناصر الثقيلة الضرورية لتكوين الكواكب.

كان لنوموتو و ووسلي دور محوري في نمذجة المراحل النهائية للتطور النجمي، والتنبؤ بالأصول المتنوعة للمستعرات العظمى، ورسم خرائط لعوائدها من التخليق النووي. لقد



الشكل 1: العالمان كينيتشي نوموتو وستانفورد ووسلي.



كان من المفترض أن يُطلق في عام 2028، لكنه أُجل إلى عام 2029، ربما بسبب مهمة صينية إلى المريخ. إذا نجح هذا النموذج التجريبي، فسننتقل إلى المشروع الأكبر: نشر 55 جهازًا علميًا على الجانب البعيد من القمر، يمثل كل منها دولة إفريقية واحدة.

لقد حالفكم حظ كبير في الحصول على دعم الصين، لأن تكلفة تنفيذ مثل هذه المهمة عبر القنوات التجارية العادية كانت ستكون هائلة.

نعم، التكلفة الإجمالية للمشروع ستنتهي لتكون حوالي مليون دولار فقط، وهو أمر غير مسبوق لمهمة فضائية. أمل أن تثبت هذه المهمة للعلماء والمهندسين الأفارقة أن التعاون يمكن أن يأخذنا حرفيًا إلى القمر.

بخصوص المشروع الكبير الذي يضم 55 جهازًا، ما هو الإطار الزمني المتوقع لتنفيذه؟ هل سيتم إرسال جميع الأجهزة الـ 55 دفعة واحدة، أم أن عملية النشر ستستغرق عدة سنوات؟

نأمل أن نبدأ في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام بعد المهمة الأولى. بالنسبة للمهمة الثانية، لدينا تصميم مختلف: ستكون الكرات قابلة للطي أثناء النقل لتوفير المساحة، وسيتم نشرها تلقائيًا عند الوصول. هذا يسمح لها أيضًا بأن تكون أكبر حجمًا وأكثر حساسية.


أعلم أنك لست متخصصة في علم الفلك الراديوي، لكن دعينا نفهم الفكرة الأساسية. نحن نتحدث عن كرات ومصفوفة من الأجهزة غير المألوفة. عندما نسمع عبارة «تلسكوب راديوي»، نتخيل عادةً أطباقًا ضخمة أو هوائيات تقليدية.

نحن نستخدم تقنية تسمى التداخل الراديوي، على غرار مشروع SKA على الأرض. من خلال توزيع هوائيات متعددة عبر مسافات واسعة، فإنها تعمل معًا لتحسين حساسية التلسكوب

هذه الفكرة العبقريّة حقًا؟

أخبرني مديري ذات مرة أن موهبتي الحقيقية هي ربط النقاط التي لا يراها الآخرون. كنت أفكر في علم الفلك الراديوي منخفض التردد، والذي يحتاج إلى بيئة هادئة تمامًا مثل الجانب البعيد من القمر. بدلاً من الهوائيات السلكية الطويلة غير العملية، يمكننا استخدام هوائي حلقي صغير. ولحل مشكلات فشل معدات الهبوط الشهيرة في المركبات الفضائية التقليدية، فكرت: لماذا لا نضعه داخل كرة؟ يمكن للكرة أن تتدحرج أو ترتد دون مشاكل الهبوط التقليدية. استغرق الأمر عشر سنوات من الكفاح وتفاني 33 عالمًا ومهندسينًا متطوعًا للحصول على فرصة إطلاق مع الصين في عام 2025.

أنت تتحدثين هنا عن النموذج التجريبي، أليس كذلك؟ كان من المفترض أن يضم أربعة أجهزة، ثم تم تقليص العدد إلى ثلاثة بسبب قيود الحمولة. متى من المقرر إطلاق هذا النموذج التجريبي؟



الشكل 1: جسد هذا العرض التصوري ثلاث مركبات هبوط منخفضة التكلفة وعالية التأثير، تُعرف باسم «BALLS» (كرات قمرية أفريقية منخفضة مرتدّة) أو A2M. تم تصميمها للبقاء والعمل بعد سلسلة وصول غير محكومة متعددة الارتدادات، وإجراء تحليل للثرى القمري في الموقع.

نستضيف اليوم كارلا ميتشال، عالمة الإفريقية التي تقود مشروعًا ثوريًا على وشك أن يري النور. إنه مسعى علمي غير مسبوق لإيصال تلسكوب راديوي إلى الجانب المخفي للقمر، والشيء الجميل هو أن هذه الفكرة تنبع من إفريقيا. إذا سمحت لي بالحديث قليلًا عن مسيرتك الشخصية: نعلم أنك التحقت بالجامعة الدولية للفضاء (ISU) بفضل فرصة استثنائية، وأن بداياتك لم تكن سهلة، خاصة كأمراة وأم شابة. هل يمكن أن تُحدثنا عن تلك المرحلة من حياتك؟

عليّ أن أوضح نقطة تفاجئ الكثيرين: أنا في الحقيقة اقتصادية ولست عالمة فيزياء فلكية! كنت أمًا شابة عزباء أدرس المالية لأعيل أبي. كنت دائمًا أحلم بالفضاء، لكنني كنت أظن أنه مقتصر على الأمريكيين أو وكالة ناسا، وليس لفتاة إفريقية. عندما وجدت نفسي بلا عمل، تواصلت مع الدكتور بيتر مارتنيز (Peter Martinez) في وكالة الفضاء الجنوب إفريقية، الذي قام بتوجيهي وأوصى بالتحاق بالجامعة الدولية للفضاء. صدمت عندما تم قبولي. كانت المعاناة المالية شديدة. فقد فشلت في الحصول على وظيفة في جزيرة مان، لكن الدعم كان مذهلاً. حتى أن زملائي في الصف جمعوا أموالهم لتمويل مشاركتي في إحدى الوحدات الدراسية في كولورادو. في النهاية، حصلت على وظيفة في مشروع SKA في جنوب إفريقيا، حيث عملت لمدة ثلاثة عشر عامًا. لكن اعذريني، لقد ذكرت أنك اقتصادية ولست عالمة فيزياء فلكية. فكيف ولدت

مقالات علمية

حوار مع

كارلا ميتشال

مؤسسة مشروع «إفريقيا إلى القمر»

CARLA MITCHELL..

The Woman Behind «Africa2Moon» Project



أجرى الحوار: د. جمال ميموني

نبذة عن الضيفة

Guest Biography

Dr. Carla Mitchell is one of the most prominent experts in space policy, space economics, and astronomical technology development in Africa. She currently serves as the African Program Manager at the South African Radio Astronomy Observatory (SARAO), where she leads the development of astronomical infrastructure in collaboration with eight African partner countries and directly oversees major strategic programs across the continent. Mitchell is recognized as an international pioneer through her founding and executive management of the «Africa2Moon» project. This ambitious space initiative aims to launch Africa's first lunar mission to deploy an innovative, low-cost radio telescope network on the far side of the moon. Alongside her technical efforts, she is widely known for her active advocacy for women's empowerment; she founded the «Women in Aerospace Africa» organization to support female researchers and engineers in STEM fields, and also established the «Foundation for Space Development Africa.» In her academic and professional background, Carla Mitchell combines deep expertise in managing funding strategies and an intimate knowledge of international technology policies.

تُعد الدكتورة كارلا ميتشل واحدة من أبرز الخبراء في مجال سياسات واقتصاد الفضاء وتطوير التكنولوجيا الفلكية في القارة الأفريقية. تشغل حاليًا منصب مديرة البرامج الأفريقية في المرصد الفلكي الراديوي بجنوب أفريقيا (SARAO)، كما تتولى قيادة وتطوير البنية التحتية الفلكية بالتعاون مع ثماني دول أفريقية شريكة، وتُشرف بشكل مباشر على برامج استراتيجية هامة في القارة. وتعتبر ميتشل شخصية ريادية على المستوى الدولي من خلال تأسيسها وإدارتها التنفيذية لمشروع «Africa2Moon» (إفريقيا إلى القمر)، وهو مشروع فضائي طموح يهدف إلى إرسال أول مسبار فضائي أفريقي لوضع شبكة تلسكوب راديوي مبتكرة ومنخفضة التكلفة على الجانب البعيد من القمر. إلى جانب جهودها التقنية، تُعرف ضيفتنا بنشاطها الكبير في دعم تمكين المرأة؛ حيث أسست منظمة «المرأة في قطاع الطيران والفضاء - أفريقيا» (Women in Aerospace Africa) لدعم الباحثات والمهندسات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تأسيسها «مؤسسة تطوير الفضاء في أفريقيا». في مسيرتها الأكاديمية والمهنية، تجمع كارلا ميتشال بين خبرة عميقة في إدارة استراتيجيات التمويل ومعرفة دقيقة بسياسات التكنولوجيا الدولية.



الشكل 5: ترفع كريستينا كوك العلم الغاني خلال مهمة أرتيميس 2، امتنانًا للدراسة الجامعية التي تلقتها في غانا.

شراكة ستكون موضع ترحيب كبير.

لقد لفت انتباهي ما قامت به رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوك عندما حملت علم غانا معها كجزء من برنامج أرتيميس. ماذا مثل لك ذلك المشهد؟


كنت متحمسة للغاية. كان ذلك تذكيرًا قويًا بأن إفريقيا يجب أن تشارك بنشاط في تشكيل مستقبلها، بدلًا من ترك الآخرين يفعلون ذلك بالنيابة عنا. أتخيل امرأة إفريقية تمشي على سطح القمر يومًا ما. يهدف هذا المشروع إلى إظهار أن الأمر ممكن وأنها لا نحتاج بالضرورة إلى ميزانيات ضخمة بمستوى ناسا لتحقيق ذلك.

صحيح تمامًا. ما يمكن أنضيفه إفريقيا إلى عالم الفضاء هو الشغف، والجرأة، والمبادرة. على الرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها القارة، يمتلك الشباب الإفريقي طاقة استثنائية. عندما ترى بعض هؤلاء الشباب، تدرك حجم الإمكانيات الكامنة في القارة.

أنتفق معك تمامًا. يمتلك الأفارقة قدرة فريدة على إيجاد الحلول بغض النظر عن الظروف. بينما غالبًا ما تقول البيئات الدولية «هذا مستحيل»، في إفريقيا، نجد طريقة. الشباب ديناميكيون بشكل لا يصدق. أأمل أن يكون هذا المشروع مجرد البداية للجيل القادم.

بينما تعمل ناسا بميزانيات ضخمة، يثبت مشروعكم مسارًا أدنى، تحقيق أهداف كبيرة بموارد محدودة وشراكات عالمية. تلسكوب على سطح القمر بتكلفة تقارب مليون دولار هو أمر مذهل. نأمل أن يثير ذلك موجة من المبادرات الفضائية الإفريقية. لقد كان من دواعي سروري التحدث معك يا كارلا، وأنا سعيد جدًا بتقديم هذه الرؤية الملهمة لقراءنا.

وأنا أيضًا سعيدة جدًا بهذا الحوار.



يُترجم إلى مشاريع تعليمية عملية مثل البرامج المدرسية، أو ورش العمل، أو الفصول الدراسية المتقدمة (masterclasses) حتى يتمكن الطلاب من التعامل مع بيانات المهمة الحقيقية أو بناء نماذج مصغرة.

نحن نعمل على تطوير نسخة تعليمية منخفضة التكلفة ومطبوعة ثلاثية الأبعاد من هذه الكرات باستخدام حواسيب Raspberry Pi. لن تقوم بإجراء علم الفلك الراديوي بمستوى فضائي، لكنها ستسمح للطلاب بإجراء تجارب حقيقية في المدارس. نريد استخدام الفضاء لإلهام حب الرياضيات والعلوم.

نعم، بالطبع. في الواقع، يمكن للجمعية الفلكية الإفريقية (AfAS) أن تكون شريكًا في هذا الصدد.

سيكون ذلك رائعًا حقًا. ليس لدي القدرة على إدارة جميع جوانب المشروع بمفردتي، لذا فإن أي



الشكل 4: تدريب الجيل الإفريقي الصاعد على التطورات العلمية.

الأخرى، لم يرغب الجانب الصيني في قذف أو رمي أي أجسام. بدلًا من ذلك، سيقوم روبوت متخصص طورته جامعة هونغ كونغ للتقنية بفك الكرات بعناية ووضعتها في الأماكن المخصصة لها، على بعد حوالي 18 مترًا تقريبًا من بعضها البعض.

في المشروع المستقبلي، سيتم تمثيل جميع الدول الإفريقية الـ 55 عبر هذه الأجهزة العلمية على الجانب البعيد من القمر. هل فكرتم في إشراك هذه الدول بنشاط، سواء من خلال وكالات الفضاء الخاصة بها، أو الجامعات، أو الشباب، أو الباحثين؟ أم أن المشروع سيبقى في الأساس مشروعًا جنوب إفريقيًا برمزية إفريقية فقط؟

لا، على الإطلاق. لقد أنشأت «مؤسسة تطوير الفضاء» للحفاظ على حيادية المبادرة. نريد أن نمج كل دولة إفريقية التصميم الأساسي حتى يتمكنوا من تصنيع جهازهم الخاص في الجامعة التي يختارونها. لدينا بالفعل متدرب غاني يعمل معنا. لم يتم الانتهاء من تصميم المهمة الكبيرة، لذا فإن الباب مفتوح على مصراعيه للمهندسين الأفارقة للمساهمة بأفكار جديدة للنشر، وأنظمة الطاقة، والإلكترونيات.

هذا المشروع إفريقي بامتياز، ذو بعد قاري واضح. إن الإلهام الذي يمكن أن يولده بين الشباب أمر بالغ الأهمية، لكنه يحتاج إلى أن

إذن أُنتم بحاجة إلى شيء يشبه معطف الشتاء ومعطف الصيف في نفس الوقت! هل تعتمدون على أجهزة تبريد وتدفئة تستهلك الطاقة، أم تتحكمون في درجة الحرارة من خلال تصميم الجهاز والمواد العازلة؟

. في الغالب من خلال التصميم والعزل. نحصل على كمية ضئيلة من الطاقة من مركبة الهبوط لتدفئة البطاريات. ولأن العزل متعدد الطبقات القياسي (MLI) غير فعال ويمكن أن يسبب سخونة زائدة في الأجسام الصغيرة، فإننا نعتمد على طلاءات متخصصة والخصائص الحرارية المحددة لموادنا المركبة.

على مدى العقود الماضية، تحدث الكثيرون عن بناء تلسكوب راديوي على الجانب البعيد من القمر. غالبًا ما اعتمدت التصورات على هوائيات تقليدية ضخمة. هل هناك مشاريع أخرى منافسة اليوم، مثل مشروع LuSEE-Night في الولايات المتحدة، وهل تواجه كراتكم نفس المشاكل مع التمدد والانكماش الحراري؟

LuSEE-Night هو المشروع الرئيسي الذي أعرفه، ويستخدم هوائيات ثنائية القطب سلكية طويلة تقليدية، والتي تواجه تحديات ميكانيكية شديدة بسبب التمدد والانكماش الحراري المستمر على القمر. كراتنا لا تواجه هذه المشكلة بنفس الدرجة. الإلكترونات الداخلية ليست متصلة بشكل صلب بحلقات الهوائي، وتمدد الحلقة الطفيف يحسن الاستقبال في الواقع. عندما تصل مركبة الهبوط الصينية، هل ستخرج الكرات تلقائيًا وتتدرج بعيدًا؟ هكذا يتخيل المرء الأمر عندما يسمع عن «كرات» على القمر. كيف سيتم ذلك عمليًا؟


كانت تلك رؤيتنا الأصلية! ولكن نظرًا لأن مركبة الهبوط تحمل العديد من الحمولات العلمية



المنطقة المحمية (المحصونة) للقمر

المادة S22 من لوائح الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات

ITU Radio Regulations Article S22



الشكل 2: يعمل القمر كدرع طبيعي يَجِب الانبعاثات الراديوية الشديدة الصادرة عن الأرض، مما يوفر على جانبه البعيد بيئة هادئة للغاية من الناحية الراديوية. وينتج هذا الموقع الفريد إجراء أرصاد عند ترددات تقل عن نحو 30 MHz، وهي ترددات يحجبها الغلاف الأيوني للأرض .

ودفته الزاوية. نريد رصد ترددات منخفضة جدًا (10 إلى 20 ميغاهرتز)، لكن الغلاف الأيوني للأرض يشوهها. من الصعب جدًا الحفاظ على تزامن مصفوفة في المدار، لذا فإن السطح المستقر للقمر يُعد مثاليًا. الجانب البعيد مثالي لأنه محمي بشكل طبيعي من التداخل الراديوي للأرض.

إذن المهمة التجريبية ستكون على الجانب القريب من القمر، وربما بالقرب من القطب الجنوبي القمري، لكنها لن تكون محمية بالكامل من التداخل الراديوي للأرض. هل سيكون ذلك كافيًا لتقليل الضوضاء الراديوية والوصول إلى الترددات التي تتحدثين عنها، أي حوالي 20 ميغاهرتز؟

سنصل إلى نطاق 10 إلى 20 ميغاهرتز، ولكن نظرًا لأن لدينا ثلاث وحدات صغيرة جدًا فقط في هذا النموذج التجريبي، فإن حساسيتنا محدودة.

لن نتمكن من رصد المصادر خارج المجرة بعد. سنركز على الانبعاثات الراديوية للمجرة، والتفاعلات الشمسية، والظواهر المرتبطة بالأرض. إن رصد الإشارات الخافتة من الكون المبكر، خط الهيدروجين 21 سنتيمترًا، سيتطلب المصفوفة الأكبر المكونة من 55 عقدة على الجانب البعيد.

لقد تطرقت سابقًا إلى إمكانية المساهمة في دراسة إشعاع الخلفية الكونية الميكروية




الشكل 5: البروفيسور كريم زغيب خلال اجتماع مع وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، وعدد من المسؤولين، لمتابعة مشروع تطوير سلسلة قيمة بطاريات الليثيوم في الجزائر.

أساتذة جامعات وباحثين وشباب وعمال، ويمكننا إقامة مصانع في الجزائر.

كما توجد إرادة سياسية، بدءًا من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ثم وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم السيد محمد عرقاب، والوزراء الآخرين الذين التقيت بهم، إذ هنالك رغبة حقيقية في تحقيق الانتقال الطاقوي، وهو ضمن أولويات الدولة.

الجزائر بلد قارة يمتد على مساحة مليونين و600 ألف كيلومتر مربع، ولديه شريط ساحلي بطول 1200 كيلومتر مع وجود موانئ في الجزائر العاصمة وجيجل وعنابة ووهران، مما يسمح بالتصدير نحو آسيا وأوروبا. كما أن بلادنا تتوفر على معادن عديدة، مثل الحديد، وقد اقترحتُ التركيز على الحديد والفوسفات والليثيوم، سواء لتصنيع البطاريات أو لتحويل هذه المعادن اعتمادًا على الطاقة الكهربائية والموارد البشرية المتوفرة، ثم بيعها للحصول على مصدر للعملة الصعبة خارج



الشكل 6: صورة مجهرية لمادة فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) المستخدمة في أقطاب البطاريات.

قمْتُ مع فريق من باحثين آخرين بابتكار بطاريات ليثيوم-حديد-فوسفات (LFP)، وهي الأرخص ثمنًا والأكثر أمانًا مقارنة بطاريات النيكل والكوبالت النادرين. حاليًا، تستعمل ما بين 80 و85 بالمئة من السيارات الكهربائية هذه البطاريات. ويمكن للبطارية الواحدة أن تسمح للسيارة بالسير لأكثر من 7 ملايين كيلومتر، كما أن مدة حياتها تتجاوز 25 سنة.

ما موقع البطاريات التي طورتموها في السوق؟ وما الذي ينافسها؟


المنافس الرئيسي لها هو بطاريات النيكل-منغنيز-كوبالت، لكنها أعلى ثمنًا، كما أن مدة حياتها لا تتجاوز بين 8 و10 سنوات. تستحوذ بطارياتنا على نحو 80 بالمئة من السوق، بينما تعود النسبة المتبقية، أي 20 بالمئة، لبطاريات النيكل-منغنيز-كوبالت.

كيف ترون مستقبل صناعة بطاريات الليثيوم في السنوات القادمة؟ وهل سيبقى النموذج الذي طورتموه مسيطرًا خاصة مع التقنيات المنافسة مثل بطاريات الصوديوم أيون؟

بطاريات الرصاص المستعملة حاليًا في سيارات البنزين موجودة منذ أكثر من 160 سنة وما تزال في السوق. أما بالنسبة لبطاريات الليثيوم، فنحن نعلم أنه لا يوجد معدن أخف من الليثيوم، ولذلك يمكن أن تستمر هذه البطاريات أيضًا لمدة 160 سنة أو أكثر.



الشكل 4: أصبحت بطاريات LFP الخيار المفضل لعدد كبير من السيارات الكهربائية بفضل أمانها وعمرها التشغيلي الطويل.



الشكل 3: تمثيل تخطيطي لبطارية ليثيوم-حديد-فوسفات (LFP)، موضحًا مكوناتها الأساسية وآلية انتقال أيونات الليثيوم بين القطبين.

ذلك يجعله إذن باهظ الثمن مقارنة بالمعادن الأخرى؟

سعره حاليًا يتراوح بين 10 و15 دولارًا للكيلوغرام. أما الكوبالت فهو الأعلى ثمنًا، إذ يتراوح بين 60 و75 دولارًا للكيلوغرام لأنه الأكثر ندرة، ثم يأتي بعده النيكل.

هل هناك مخاطر متعلقة بالتلوث الذي قد يسببه الليثيوم خلال عمليات الاستخراج والتكرير؟

الليثيوم في حد ذاته لا يشكل خطورة كبيرة، لكن يجب احترام شروط السلامة البيئية، مثل منع عمل النساء الحوامل أو القُصّر في هذا المجال، وكذلك اعتماد مبدأ «صفر نفايات» في الموانئ، مع إعادة التدوير واحترام المعايير البيئية وعدم التسبب في انبعاثات كربونية، والاعتماد على الطاقة النظيفة ضمن ما يُعرف بالاقتصاد الدائري.

قبل استخراج الليثيوم، يجب الحصول على التراخيص البيئية، ولذلك فمن الأفضل أن تكون هذه المناجم تابعة للدولة وألا تُستغل من طرف الخواص فقط، لأن بعض المستثمرين يبحثون عن الربح السريع دون مراعاة طرق التخلص من النفايات وفق المعايير المعتمدة.

تُعدّ، بروفيسور، مرجعًا عالميًا في مجال أبحاث بطاريات الليثيوم، ما الذي يميز الأبحاث التي قمتم بها؟

ذات أساس بترولي مع ملح الليثيوم المكوّن من الفلوروفوسفات. بينما الكاثود يتكون من الألمنيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز وفوسفات الحديد والأوكسجين.


الكوبالت يوجد أساسًا في إفريقيا، إذ تمتلك الكونغو أكثر من 60 بالمئة من المخزون العالمي. أما النيكل فيوجد في أندونيسيا وكاليدونيا الجديدة وروسيا وكندا وقليل منه في الولايات المتحدة الأمريكية. المنغنيز متوفر في كندا وجنوب إفريقيا، بينما الحديد والسيليسيوم متوفران في معظم مناطق العالم. أما الألمنيوم فيوجد في البرازيل وجنوب إفريقيا وبعض دول الخليج العربي. وبالنسبة للفوسفات، فهو متوفر في الجزائر والمغرب وتونس وروسيا وكندا وأرمينيا.

هل يعني هذا أنه ليست هناك ندرة في الليثيوم؟

يجب أن نفهم أولاً أن سوق الليثيوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سوق الإلكترونيات والاستهلاكية، مثل الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية، سوق تخزين الطاقة، وسوق السيارات الكهربائية. ما يُسجل فيه النقص فعلاً هو معادن الليثيوم والنيكل والكوبالت، بما يفرض اعتماد الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، وهذا أمر ضروري خلال السنوات العشر القادمة، وإلا فلن تكون هذه المعادن الثلاثة كافية.

نفهم إذن أن الليثيوم ليس معدنًا نادرًا، لكن الاستعمال المتزايد يهدد بنقصه؟

بالفعل، المشكلة تتمثل في الاختلال بين العرض والطلب.



الشكل 2: البنية الأساسية لبطارية الليثيوم-أيون، موضحًا الأنود والكاثود والإلكتروليت والفاصل، ومسار انتقال أيونات الليثيوم والإلكترونات أثناء الشحن والتفريغ.



الشكل 7: يُستخرج الليثيوم من مصدرين رئيسيين: الصخور الصلبة، كما في المناجم المفتوحة، والمحاليل الملحية الغنية بالليثيوم في البحيرات المالحة، التي تُعد من أهم مصادر إنتاجه عالميًا.

قطاع المحروقات.

شهدت منطقة الهقار في الجنوب الجزائري

استكشافات استراتيجية واعدة لمعدن الليثيوم. هل توجد عمليات تنقيب وهل نعرف حجم هذا المخزون؟

إلى حد الآن لا نعرف الكمية بدقة، لكن ما أعرفه هو أن ثلاث دراسات تجري في هذا الخصوص، وستنتهي خلال أشهر. إنجاز مشروع من هذا النوع يستغرق سنوات، ومن المتوقع أن يكون تحويل المعادن في مدينة عنابة، لأن مخزون الحديد والفوسفات قريب منها، كما أنها تتوفر على ميناء.

بالنسبة لليثيوم الموجود في الصحراء، هل

تطرح مسألة نقله عبر آلاف الكيلومترات تحديًا لوجستيًا؟

للإجابة عن هذا السؤال، سأعطيك مثالًا من كندا، حيث يوجد مجمع متخصص في البطاريات يُنقل إليه الليثيوم من مسافة تقارب 2500 كيلومتر، وفي مناطق تصل فيها درجات الحرارة إلى ناقص 50 درجة مئوية. وقد أنجزت حكومة كيبيك البنى التحتية اللازمة، خاصة خطوط السكك الحديدية، وهو ما يُعد استثمارًا استراتيجيًا مهمًا.

الأمر يتطلب رؤية ومخططًا استراتيجيًا حتى تستثمر الجزائر في البنى التحتية، خاصة أن الصحراء الجزائرية غنية وتمتلك أيضًا مقومات زراعية. وقد قام مسؤولون جزائريون بزيارة إلى المواقع الكندية خلال العام الماضي أين أطلعهم على طريقة العمل هناك.

بالعودة إلى تخصصكم الجامعي في مجال

ليست لدي أي انتماءات سياسية، لكن ما أؤكدته هو أنه مع وصول السيد عبد المجيد تبون إلى رئاسة الجمهورية، ووجود وزرائه في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أصبحت هناك إرادة سياسية قوية لتحقيق الانتقال الطاقوي والاقتصادي. في السابق لم يكن هناك اهتمام كبير بالعلماء الجزائريين في الخارج، أما اليوم فأنا متفائل، ويمكننا أن نتقدم ببطء لكن بخطوات ثابتة.

لتطوير سوق الليثيوم، يجب استثمار ما بين 2.5 و3 مليارات دولار أمريكي، كما أن كل مصنع تحويل يتطلب نحو 100 مليون دولار، لذلك ينبغي التفكير في استراتيجية تمويلية لجلب المستثمرين الجادين.

وفيما يخص نقل التكنولوجيا، هل توجد جهات يمكن أن تساعد في فتح هذه المصانع بالجزائر؟


هذه التكنولوجيا ليست معقدة جدًا، وإذا كانت هناك رخص أو براءات معينة فيمكن شراؤها، لذلك فإن نقل التكنولوجيا ليس المشكلة الأساسية. وكما ذكرت سابقًا، يبقى التكوين التقني هو الأساس، ويجب أن يبدأ منذ المراحل التعليمية المبكرة لدعم قطاع التصنيع.

انطلاقًا من تجربتكم الطويلة في البحث

العلمي وعالم الصناعة، ما الرسالة التي توجهونها للشباب الراغبين في اقتحام هذه المجالات؟

العمل ثم العمل. أنا أؤمن بأمرين أساسيين هما المثابرة والإصرار.

شكرا لك دكتور على هذا اللقاء الشيق



مهمة أرتميس II حلم العودة للقمر يتجدد

Mission Artemis II: A Renewed Dream of Returning to the Moon

الشيماء أمين خوجة

وحدة البحث في الوساطة العلمية - CERIST



مستدامة على سطحه، لتمهيد الطريق لمهمات فضائية أخرى؛ أبرزها الرحلات المستقبلية إلى كوكب المريخ. مثلت مهمة أرتميس 2 أول رحلة مأهولة ضمن برنامج أرتميس، إلا أن هدفها لا يتمثل في الهبوط على سطح القمر، بل في التخليق حوله والعودة إلى الأرض، مع اختبار العديد من الجوانب التقنية والتشغيلية للمركبة، والأنظمة المرافقة لها، إضافةً إلى تحقيق أهداف علمية أخرى تُمهّد للمهام القادمة.

يتكوّن طاقم المهمة من أربعة رواد فضاء هم ريد وايزمان (Reid Wiseman)، فيكتور غلوفر

مستدامة على سطحه، لتمهيد الطريق لمهمات فضائية أخرى؛ أبرزها الرحلات المستقبلية إلى كوكب المريخ. مثلت مهمة أرتميس 2 أول رحلة مأهولة ضمن برنامج أرتميس، إلا أن هدفها لا يتمثل في الهبوط على سطح القمر، بل في التخليق حوله والعودة إلى الأرض، مع اختبار العديد من الجوانب التقنية والتشغيلية للمركبة، والأنظمة المرافقة لها، إضافةً إلى تحقيق أهداف علمية أخرى تُمهّد للمهام القادمة.

يتكوّن طاقم المهمة من أربعة رواد فضاء هم ريد وايزمان (Reid Wiseman)، فيكتور غلوفر

بعد مرور أكثر من خمسين سنة على أول مرةٍ وطأت فيها قدم الإنسان سطح القمر، حين حقّقت البشريّة خطوةً عملاقةً في مجال استكشاف الفضاء والسفر إليه، يتجدّد الحلم اليوم مع جيلٍ جديدٍ يطمح إلى الدّهاب أبعد ممّا حقّقته الأجيال السابقة.

ربما لم تُنحَ الفرصة لمعظمنا لمشاهدة رحلة أبولو 11 (Apollo 11)، وعيش تلك اللحظات الحماسيّة التي شهد فيها العالم أولّ إنسانٍ يخطو على سطحٍ آخر غير سطح الأرض، لكنّنا هذه المرّة قد نكون شهودًا على عودة الإنسان إلى القمر في واحدةٍ من أكثر المهمّات الفضائية طموحًا وإثارةً، وهي مهمّة أرتميس.

مهمّة تجمع بين الطموح والفضول العلمي، وتترامن مع التطور التكنولوجي الذي نعيشه اليوم، ممّا يُتيح لنا فرصة متابعة تفاصيلها لحظةً بلحظة، وعيش التجربة بطريقة لم تكن ممكنةً في الماضي. فلنتعرّف عن قرب على مهمة أرتميس وأهدافها، وما الذي تحمله لمستقبل استكشاف الفضاء.

تُعدّ مهمة أرتميس 2 المرحلة الثانية ضمن برنامج أرتميس، وهو سلسلة من المهمّات الفضائية التي بدأت عام 2022، بهدف إعادة الإنسان إلى القمر، بل و تسعى أيضًا إلى تأسيس محطة



الشكل 1: طاقم مهمة «أرتميس الثانية» (Artemis II)، أول رحلة مأهولة ضمن برنامج أرتميس استعدادًا للعودة إلى القمر.

Victor Glover أول شخصي من ذوي البشرة السمراء يشارك في مهمة قمرية. أما Jeremy Hansen فسيكون أول رائد فضاء كندي يشارك في مهمة متجهة نحو القمر، في حين ينتمي بقية أفراد الطاقم إلى وكالة ناسا NASA التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. وبالرغم من الصّراع الدائم بين القوى الدولية العظمى، والتي تنعكس مباشرةً على السّباق نحو الفضاء مثلما كان الأمر في برنامج أبولو، إلّا أنّ برنامج أرتيميس يضيف إلى ذلك أهدافاً علمية، وتعاوناً دولياً يُبرز أنّ الغاية في الأخير لا تقتصر على التّنافس، ولكن أن نستكشف ما فوق كوكبنا، وآفاق أبعد في الكون.

خلال الرحلة، تعاون رواد الفضاء مع فرق علمية على الأرض لجمع بيانات وتجارب ستُستخدم لفهم تأثير السفر في الفضاء العميق، وتحسين مستقبل الرحلات البشرية نحو القمر والمريخ، وها هي بعض التجارب التي نُفذت خلال هذه المهمة.


كيف يتغيّر جهاز المناعة في الفضاء؟

إحدى الدراسات الأساسية في المهمة هي دراسة المؤشرات البيولوجية لجهاز المناعة (Immune Biomarkers)، وتركّز على تحليل كيفية تغيّر جهاز المناعة أثناء السفر إلى الفضاء. سيقوم الرواد بجمع عيّنانٍ من اللّعب قبل وأثناء وبعد المهمة، لتحليل البروتينات والهرمونات والفيروسات التي تعكس حالة المناعة.

وبسبب المساحة الصغيرة والمحدودة داخل مركبة أوريون (ORION) التي كان على متنها رواد الفضاء، لم يتم استخدام التبريد لحفظ العينات. بدلاً من ذلك، سيتم استخدام طريقة مبتكرة تعتمد على تجفيف اللّعب على أوراق خاصة



الشكل 2: يجمع رواد الفضاء عينات للعباب على متن محطة الفضاء الدولية لدراسة تأثير بيئة الفضاء في جهاز المناعة. وتُعد هذه التجربة جزءاً من الأبحاث الطبية التي ستستمر ضمن برنامج أرتيميس لدعم الرحلات البشرية المستقبلية إلى القمر وما بعده.



الشكل 3: رقاقة «عضو على رقاقة» (Organ-on-a-Chip) لدراسة تأثيرات بيئة الفضاء على الأنسجة البشرية.

تُحفظ داخل دفاتر صغيرة، ثم إعادة تربطها وتحليلها لاحقاً على الأرض. هذه الطريقة تساعد العلماء على تتبّع التغيّرات البيولوجية عبر الزمن وفهم كيفية تأثر جهاز المناعة بالفضاء.


دراسة للأداء البشري

ARChER وهي مختصر لعبارة Artemis Research for Crew Health and Readiness والتي تختص بدراسة الأداء، السلوك، والنوم؛ أي كيفية أداء رواد الفضاء كأفراد، وكفريق خلال المهمة.

سيقوم الرواد بارتداء أجهزة مراقبة (Actigraphy Devices) قبل وأثناء وبعد الرحلة، لقياس أنماط

التأثيرات الخلوية

ومن المقرّر استخدام تقنية (AVATAR : Virtual Astronaut Tissue Analog Response)



الشكل 4: مقطع تخطيطي لمركبة أوريون يوضح مواقع أجهزة قياس الإشعاع داخل الكبسولة، بما في ذلك دميتا القياس «هيليغا» و«زوهار» المزودتان بمئات المستشعرات لمحاكاة تعرض جسم الإنسان للإشعاع في الفضاء السحيق.

والتي تعتمد على (organ-on-a-chip) وهي أعضاء مصغرة على شرائح، تحتوي على الخلايا البشرية الخاصة برواد الفضاء أنفسهم في المهمة. تُوضع هذه الأجهزة داخل المركبة لدراسة تأثير الإشعاع الفضائي، وانعدام الجاذبية على المستوى الخلوي. بعد انتهاء المهمة، يتم تحليل هذه العينات للحصول على كامل التفاصيل.

القياسات العامة لأرتيميس 2

تهدف هذه القياسات إلى بناء قاعدة بيانات شاملة حول تأثير الرحلات الفضائية على الإنسان. وتبدأ الدراسة قبل حوالي ستّة أشهر من الإطلاق، وتستمرّ حتّى شهر بعد العودة، وتشمل جمع بيانات طبية، وسلوكية، ونفسية بشكل منظم. ورغم أنّ سحب الدم سيحدث فقط قبل وبعد المهمة، فإنّ جمع عيّانات اللّعب المجفّفة سيتمّ أثناء الرحلة، إلى جانب اختبارات الإدراك والسلوك والتوازن. هذه البيانات تساعد العلماء على فهم شامل لكيفية تكيف الجسم مع الفضاء العميق وتغيراته.

مراقبة مستويات الإشعاع

خلال الرحلة، تمّ إطلاق أقمار صناعية صغيرة تُعرف باسم CubeSats، في مدار أرضي مرتفع أثناء انتقال مركبة Orion نحو القمر، وذلك

بهدف تحليل الإشعاع في مناطق مختلفة من الفضاء القريب والبعيد عن الأرض. كما يحمل رواد الفضاء أجهزة قياس إشعاع شخصية توضع في جيوبهم لقياس نسبة التعرّض الإشعاعي في الوقت ذاته خلال الرحلة، بالإضافة إلى أجهزة مثبتة داخل المركبة تراقب مستويات الإشعاع في مواقع مختلفة داخل المركبة، وأنظمة تنبيه تُفعل عند ارتفاع مستوى الإشعاع، مثلاً أثناء العواصف الشمسية. كما تمّ استخدام أجهزة إضافية طوّرتها وكالة الفضاء الألمانية لرصد توزيع الإشعاع داخل المركبة بشكلٍ أكثر دقّة.

بالإضافة إلى كلّ هذه التجارب المتنوّعة التي تخصّ صحة وسلامة كلّ من رواد الفضاء والمركبة. وخلال الرحلة التي يصل فيها الإنسان إلى أبعد نقطة من الأرض محطّلاً المسافة التي وصلت إليها رحلة أبولو 13 سابقاً، ستقرب مركبة Orion من الجانب البعيد للقمر، وهو الجزء الذي لا يمكن رؤيته من الأرض مطلقاً. وخلال فترة قصيرة تمتدّ لحوالي ثلاث ساعات، يصوّر الطاقم السطح ويتمّ تحليل الصور علمياً، مع التركيز على التكوينات الجيولوجية المختلفة مثل الفوهات الناتجة عن الاصطدامات القديمة والتدفقات البركانية التي شكّلت سطح القمر في مراحلها المبكرة.

بيانات دقيقة لفهم كيفية تشكّل القمر

وتحضيراً لهذه المرحلة بالضبط، تلقى رواد الفضاء تدريباً جيولوجياً مكثّفاً سواء داخل الفصول التدريبية أو في مناطق على الأرض تشبه بيئة القمر من حيث التّضاريس، حتّى يتمكنوا من ملاحظة أدق التفاصيل المتعلقة بأشكال الصخور وألوانها، وهي عناصر أساسية تساعد العلماء على إعادة بناء التاريخ الجيولوجي للمنطقة التي يدرسونها.

لا يعتبر هذا مجرّد توثيق بصري، بل بيانات علمية دقيقة تساعد في فهم كيفية تشكّل سطح القمر وتطوّره عبر ملايين السنين. كما أنّ هذه الخبرة ضرورية للغاية للبعثات المستقبلية التي تتوجّه إلى مناطق أكثر تعقيداً على القمر، مثل منطقة القطب الجنوبي، التي تُعدّ من أهمّ أهداف الاستكشاف القمري القادم.

كلّ هذه الأبحاث مع بعضها تشكّل رؤية متكاملة تهدف إلى حماية صحّة رواد الفضاء، وضمان سلامتهم خلال الرحلات الطويلة، وفي النهاية، فإنّ كلّ هذه البيانات ستساهم في تطوير تقنيات واستراتيجيات جديدة تمهّد الطريق لبعثات بشرية أكثر أماناً إلى القمر والمريخ، وتدعم الهدف الأكبر المتمثّل في توسيع وجود الإنسان خارج الأرض بشكل مستدام.



الشكل 2: أبرز الابتكارات التي تُحدث تحولاً في تقنيات الطاقة النظيفة، وتشمل الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأعطال، والهندسة الذرية لتحسين البطاريات، ورفع كفاءة أنظمة الطاقة المتجددة.

تحسين الشبكة في الوقت الفعلي، وقد ثبت أنها قادرة على تقليل اضطرابات الشبكة بنسبة 40%. وبهذه الطريقة، يحول الذكاء الاصطناعي البطاريات من مجرد وحدات تخزين سلبية إلى أصول ذكية ونشطة تخلق قيمة اقتصادية هائلة وتُعزز استقرار الشبكة.

الثورة الصامتة

إنّ مستقبل الطاقة النظيفة لا يُبنى فقط بالهياكل الضخمة التي نراها، بل يُصمّم بالخوارزميات الذكية والجزيئات المُهندسة بدقة. لقد كشفت لنا هذه الرحلة أن هذه الثورات «غير المرئية» مترابطة وتعتمد على بعضها البعض. فالذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يتنبأ بالأعطال يعتمد على محاكاة بيانات دقيقة، وهذه الدقة تتزايد بفضل فهمنا العميق لهندسة المواد على المستوى الذري. هذا التحكم الدقيق بالجزيئات لم يكن ممكناً لولا قدرتنا على «رؤية» الرقصة الديناميكية للأيونات داخل البطارية.

في النهاية، لا تتحقّق القيمة الكاملة لهذه البطاريات المتطورة إلّا عندما تقوم أنظمة ذكية بتحويلها إلى أصول استراتيجية بمليارات الدولارات على شبكة الكهرباء. إنَّها حلقة متكاملة وقوية: الذكاء الاصطناعي يسرّع من وتيرة علوم المواد، والتي بدورها توفر أجهزة أفضل للذكاء الاصطناعي لإدارتها، ممّا يولّد المزيد من البيانات ويعزز الدورة بأكملها. هذه هي الثورة الصامتة الحقيقية التي تعيد تشكيل علاقتنا بالطاقة، وبينما يعمل الذكاء الاصطناعي والمواد الجديدة على حلّ تحديات اليوم، يبقى السؤال المثير للتفكير: ما هو الشكل الجديد تمامًا لتخزين الطاقة الذي قد تفتحه هذه التقنيات للجيل القادم؟

التأثير الإيجابي: في بحث يهدف إلى تحسين أقطاب السيليكون في بطاريات الليثيوم أيون، قام الباحثون بخلط، أو «تسبيك» السيليكون بكمية صغيرة من البورون. أدّى هذا التعديل البسيط إلى إنشاء درع كهربائي واقٍ حول الجسيمات النانوية، وكانت النتيجة مذهلة: تحسن في عمر البطارية بمقدار 3 أضعاف، مع الحفاظ على 82.5% من سعتها بعد 1000 دورة شحن وتفريغ.

التأثير السلبي: في دراسة أخرى على بطاريات التدفق، أضاف الباحثون مجموعة هيدروكسيل واحدة (OH^-) إلى مركب يعتمد على الكروم. أدّى هذا التغيير الطفيف إلى تشويه الشكل الجزيئي للمركب. وكانت النتيجة صادمة: أصبح المركب ينقل الإلكترونات ببطء أكبر 100 مرة، ممّا أدّى إلى شلّ كفاءته تمامًا.

يوضح هذان المثالان الأهمية القصوى لـ «الهندسة الدقيقة» في علوم المواد. إنّ القدرة على التحكم في بنية الجزيئات بدقة ذرية هي مفتاح تطوير الجيل القادم من البطاريات، حيث يمكن لذرّة واحدة في المكان الخطأ أن تقضي على كفاءة نظام بأكمله. هذه الدقة على المستوى الذري تسلط الضوء على تحدٍّ حاسم: كيف يمكننا أن نعرف ما يحدث داخل البطارية في الوقت الفعلي؟ اكتشاف مفاجئ في بطاريات الزنك-أيون يقدم لنا الإجابة.

اكتشاف «الحياة السرية» داخل البطارية

تُعد بطاريات الزنك-أيون بديلاً واعدًا لبطاريات الليثيوم-أيون، خاصةً لتخزين الطاقة على نطاق الشبكة، وذلك لكونها أكثر أماناً ووفرةً وأقلّ تكلفةً. ولكن حتى وقتٍ قريبٍ، كان الفهم لكيفية تحرّك أيونات الزنك داخل البطارية محدودًا. وقد خرج بحثٌ حديثٌ باكتشاف مفاجئ يغيّر نظرنا تمامًا لهذه العملية.

كان يُعتقد سابقًا أنّ أيونات الزنك تتحرّك بشكل مستقلّ عبر المحلول الكهربائي السائل (الإلكتروليت). لكن الأبحاث الجديدة أظهرت أنّ الواقع أكثر تعقيدًا وديناميكيةً، فبدلاً من السفر منفردةً، تشكّل الأيونات تجمعات مؤقتة أو «قوافل» مع جزيئات الماء المحيطة بها. هذه التجمعات، التي تتراوح أحجامها من أيونين إلى 22 أيونًا، تتشكّل وتنفكّك في أجزاء من تريليون من الثانية. هذا السلوك يشبه ما وصفه أحد الباحثين بالعبارة التالية: «إنّه مثل وجود ازدحامٍ مروري يتحرّك بسرعةٍ كبيرةٍ ويعيد تنظيم نفسه باستمرار لدرجة أنه لا يتعرّأ أبداً».

تكمّن أهميّة هذا الاكتشاف في أنّه يغيّر الطريقة

ما وراء الألواح الشمسية أسرار مدهشة تقود ثورة الطاقة النظيفة

Beyond Solar Panels
The Hidden Science Behind Clean Energy

بقلم د. عيسى مفلح

وحدة تنمية الأجهزة الشمسية بمركز تنمية الطاقات المتجددة



عندما نفكر في الطاقة المتجدّدة، تتبادر إلى أذهاننا صورٌ مألوّفة، توربينات الرياح الشّاهقة التي تدور برشاقةٍ في الأفق، أو الصفوف اللّامتناهية من الألواح الشمسية التي تتلألأ تحت ضوء الشمس. هذه الرموز المرئية هي واجهة لثورة الطاقة النظيفة، لكنّها لا تروي القصة الكاملة. في الواقع، إنّ الابتكارات الأكثر عمقًا وتأثيرًا تحدث على مستوياتٍ لا يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة، في عوالم الميكرو والرقمنة. بعيدًا عن الهياكل الفولاذية والزجاجية الضخمة، هناك ثورة صامتة يقودها العلماء والمهندسون في المختبرات ومراكز البيانات. إنهم

كيف تُحدث التعديلات الجزيئية ثورةً في البطاريات؟

يعتمد أداء البطاريات بشكلٍ أساسي على هندسة المواد على المستوى الجزيئي. في هذا العالم الدقيق، يمكن أن يؤدي تغيير موضع بضع ذراتٍ إلى إحداث فارقٍ بين تحقيق اختراق علمي أو فشل ذريع. ويكشف بحثان حديثان عن هذه الحقيقة من خلال مثالين متناقضين.



الشكل 1: تمثيل فيزيائي لبنية نانوية على المستوى الذري، يوضح كيفية ترتيب الذرات وترابطها داخل المواد المتقدمة المستخدمة في تقنيات تخزين الطاقة والبطاريات الحديثة.

بيانات واقعية لسيناريوهات أعطال محتملة لم تحدث من قبل. هذه هي قوّته المدهشة وغير المتوقّعة. إنّه لا يتعلّم فقط من الأعطال التي وقعت، بل يتخيّل الأعطال التي يمكن أن تقع، ممّا يسمح للمهندسين بالاستعداد لها مسبقًا. أثبتت هذه المقاربة فعاليتها بشكل مذهل. فقد أظهرت الأبحاث أنّ أنظمة الكشف عن الأعطال المعزّزة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تحقّق دقّة تشخيصيّة تصل إلى 95.2%. هذا التحوّل الجذري يسمح لمشغلي الطاقة بالاستعداد لمجموعةٍ أوسع بكثيرٍ من المشاكل المحتملة، ممّا يزيد بشكلٍ كبيرٍ من موثوقيّة وسلامة البنية التحتيّة للطاقة الخضراء. لكن هذه القدرة التنبؤيّة ليست سوى نصف القصة. فالمكوّنات المادية التي يراقبها الذكاء الاصطناعي تشهد بنفسها ثورةً تبدأ من المستوى الذري.

الذكاء الاصطناعي: التنبؤ بأعطالٍ لم تحدث من قبل

يعتمد الذكاء الاصطناعي التقليدي على مبدأ بسيط: التعلم من الماضي، فهو يحلّل كمّيّاتٍ هائلةٍ من البيانات التاريخية لتحديد الأنماط التي تشير إلى فشل وشيك. ولكن ماذا لو كانت الأنظمة الجديدة للطاقة المتجدّدة موثوقة لدرجة أن الأعطال الكبرى نادرةٌ جدًّا؟ هنا تظهر مشكلة «ندرة البيانات»، حيث لا توجد بيانات كافية عن الأعطال لتدريب النماذج التقليدية بفعالية.

هنا يأتي دور الاختراق المذهل المتمثّل في الذكاء الاصطناعي التوليدي. بدلاً من الاقتصار على تحليل الماضي، يمتلك هذا النوع من الذكاء الاصطناعي القدرة على محاكاة وتوليد

الطاقة الشمسية على سطح القمر

مستجدات وتحديات في ضوء عودة الإنسان إلى القمر

Solar Energy on the Moon
New Advances and Challenges for Humanity's Return

الشكل 1: صورة متخيلة لمزارع الطاقة الشمسية على القمر، مربوطة بوحدة زراعة وحياء، غالبا ما تكون في القطب الجنوبي للقمر.

د. فاطمة الزهراء بن عراب


أستاذ محاضر في الطاقات المتجددة- جامعة الجلفة



لم تعد العودة إلى القمر مجرد مشروع استكشاف فضائي، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الإنسان على بناء أنظمة طاقوية خارج الأرض. فمع انتقال برامج الفضاء من "رحلات زيارة" إلى "مشاريع الإقامة الطويلة"، برز سؤال جوهري: كيف يمكن توفير طاقة مستدامة في بيئة معزولة وقاسية لا تسمح بأي هامش للخطأ؟ في هذا السياق، تبرز الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، كأحد أهم الأعمدة التقنية لمستقبل الوجود البشري على القمر.

رغم التطور الكبير في تقنيات الفضاء، تبقى الطاقة العقبة الأكثر حساسية أمام إنشاء قواعد قمرية دائمة.

فلاعتماد على الوقود التقليدي غير ممكن عمليًا بسبب تكاليف النقل الهائلة من الأرض. لهذا تتجه وكالات الفضاء والشركات التقنية نحو الطاقات المتجددة باعتبارها الحل الأكثر واقعية واستدامة خلال العقود القادمة.



الشكل 2: تصميم يظهر تقنيات استغلال الطاقة المنتجة من مصادر المتجددة على القمر وكذا نقلها إلى كوكب الأرض.

خاصة عند الحاجة لتغطية فترات الظلام الطويلة. لهذا تتجه الأبحاث نحو خلايا الوقود التجديدية، حيث تُستخدم الكهرباء الشمسية نهائيًا لتحليل الماء إلى هيدروجين وأكسجين، ثم يُعاد دمجهما داخل خلايا الوقود لإنتاج الكهرباء ليلاً. هذا النظام لا يوفر الكهرباء فقط، بل ينتج الماء أيضًا، ما يجعله حلًا متعدد الوظائف داخل البيئات المغلقة. ومن المتوقع أن تعتمد القواعد القمرية المستقبلية على مزيج من الطاقة الشمسية، التخزين الهيدروجيني، والبطاريات، أي أن مستقبل الطاقة القمرية سيكون قائمًا على مفهوم «النظام الهجين» لضمان الاستقرار والمرونة التشغيلية.

تصنيع الخلايا الشمسية من موارد القمر

أحد أكثر الاتجاهات البحثية أهمية يتمثل في تصنيع الخلايا الشمسية مباشرة من تربة القمر بدل نقلها من الأرض. فالريغوليث القمري يحتوي على السيليكون والأكسجين ومعادن يمكن استخدامها لإنتاج مواد شبه موصلة. نجاح هذا التوجه سيؤدي إلى تقليل تكاليف النقل بشكل جذري، وسيفتح الباب أمام استقلالية طاقوية حقيقية خارج الأرض. لكن التحدي الأساسي يتمثل في أن عمليات التصنيع نفسها تحتاج إلى طاقة كبيرة، ما يفرض الاعتماد في البداية على أنظمة دعم أولية قبل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي. ورغم أن هذه التقنية ما تزال في مراحل البحث، فإنها تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد فضائي يعتمد على الموارد المحلية بدل الإمداد المستمر من الأرض.

التحول نحو استخدام الطاقات المتجددة على القمر لم يعد فكرة مستقبلية بعيدة، بل أصبح جزءًا من الخطط العملية للبعثات القادمة. ومع التطور السريع في تقنيات الخلايا الشمسية والتخزين الهيدروجيني والشبكات الذكية، تبدو الطاقة الشمسية اليوم الخيار الأكثر واقعية لدعم الوجود البشري طويل الأمد خارج الأرض. غير أن النجاح الحقيقي لن يعتمد على إنتاج الكهرباء فقط، بل على بناء منظومات طاقوية متكاملة قادرة على التكيف مع بيئة قاسية ومعزولة، بأعلى درجات الكفاءة والاستدامة. قد يكون القمر، خلال العقود القادمة، أول مختبر حقيقي تطبق فيه البشرية مفهوم "المدن المعتمدة بالكامل على الطاقات المتجددة" خارج كوكب الأرض.



الشكل 3: استخدام الهيدروجين مخزنًا للطاقة على القمر، اعتمادًا على المياه المتجمدة والطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

- الهيدروجين الناتج يستخدم كوسيلة لتخزين الطاقة.

أي أن القاعدة القمرية المستقبلية ستعتمد على منظومة مترابطة تجمع بين الطاقة والمياه والتخزين الكيميائي.

تطور تقنيات المزارع الشمسية القمرية

لا يعتمد التوجه الحالي على الألواح التقليدية الثقيلة، بل على أنظمة خفيفة ومرنة قابلة للنقل والتمدد الذاتي. من أبرز هذه التقنيات أنظمة VSAT العمودية، المصممة لالتقاط أشعة الشمس المنخفضة قرب أفق القمر، خاصة في مناطق القطب الجنوبي. وتستخدم هذه الأنظمة ألواحًا مرنة قابلة للطي تعرف باسم ROSA، تتميز بخفة الوزن وسهولة النقل والكفاءة العالية مقارنة بالألواح التقليدية. كما يجري تطوير أنظمة قادرة على تتبع حركة الشمس تلقائيًا لرفع مردود التحويل الطاقوي، إضافة إلى مشاريع لنقل الطاقة لاسلكيًا أو عبر شبكات ذكية تربط بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. وتُظهر هذه المشاريع أن مستقبل الطاقة القمرية لن يقوم على محطة واحدة معزولة، بل على «شبكة طاقوية قمرية» متكاملة تشبه الشبكات الذكية الحديثة على الأرض.

تخزين الطاقة... مفتاح الاستمرارية

يبقى تخزين الطاقة التحدي المركزي لأي مشروع يعتمد على المصادر المتجددة فوق القمر. فالاعتماد الكامل على البطاريات غير عملي بسبب كتلتها الكبيرة وصعوبة نقلها من الأرض،

الشمسية عرضة مباشرة للإشعاعات الكونية والأشعة فوق البنفسجية، ما يؤدي إلى تدهور الخلايا مع مرور الزمن. أما الغبار القمري، أو "الريغوليث"، فيمثل تحديًا تقنيًا بالغ الخطورة. فربو غبار دقيق وحاد يلتصق بالمعدات بفعل الشحنات الكهروستاتيكية، ويؤثر على كفاءة الألواح وأنظمة الحركة والتوصيلات الكهربائية. إضافة إلى ذلك، تواجه المعدات تغيرات حرارية حادة جدًا، حيث قد تتجاوز درجات الحرارة 120 درجة مئوية نهارًا، وتنخفض إلى أقل من 170 درجة تحت الصفر ليلاً، ما يفرض تطوير مواد وأنظمة تبريد وعزل جديدة تختلف عن الأنظمة الأرضية التقليدية.

القطب الجنوبي الموقع الأمثل للطاقة الشمسية

رغم قسوة البيئة القمرية، تشير الدراسات إلى أن القطب الجنوبي للقمر يمثل أفضل موقع لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وتكمن أهمية هذه المنطقة في وجود مرتفعات تتلقى ضوء الشمس لفترات طويلة جدًا قد تصل إلى 90% من الزمن، وهي مناطق تُعرف أحيانًا بـ "قمم الضوء شبه الدائم". هذه الميزة تقلل بشكل كبير من مشكلة الانقطاع الطويل للطاقة، وتزيد الجدوى الاقتصادية والتشغيلية للأنظمة الشمسية. في المقابل، تحتوي الحفر المظلمة المجاورة على جليد مائي يمكن استغلاله لإنتاج الماء والأكسجين والهيدروجين. وهنا تظهر العلاقة التكاملية بين الطاقات المتجددة وإدارة الموارد:

- الطاقة الشمسية توفر الكهرباء.
- الماء يُستخرج من الجليد.


وتُصنّف الأنظمة الجيوحرارية حسب درجة حرارة وعمق الخزانات المستغلة:

الهيدروجيولوجيا والطاقة الحرارية الأرضية: علاقة تكافلية


يلعب المهندس الهيدروجيولوجي دوراً أساسياً في كلِّ مرحلةٍ من مراحل مشروع الطاقة الجيوحرارية الأرضية. ويتمثّل ذلك في تحديد طبقات المياه الجوفية العميقة التي تتمتع بدرجات حرارة ومعدّلات تدفق كافية، وتحديد خصائصها الهيدروديناميكية (المسامية، والنفاذية، والانتقالية)، ونمذجة سلوك الخزّان تحت ضغوط التشغيل. ومن المفاهيم الأساسية مفهوم الزوج الجيوحراري (Geothermal Dual System)، الذي ينطوي على ضخّ المياه الساخنة من بئر إنتاج وإعادة حقنها، بعد تبريدها في نفس الخزان المائي عبر بئر إعادة حقن، ويتيح هذا النظام الحفاظ على ضغط الخزان وضمان استدامة المورد، ويوضح الرسم البياني أدناه كيفية عمل الزوج الجيوحراري.

آفاق وأعدة في الجزائر

على الرغم من الإمكانيات الجيوحرارية الجذّابة للغاية، لا تزال الطاقة الجيوحرارية غير معروفة وغير مستغلة في الجزائر. ومع ذلك، في المستقبل القريب، لن يكون الغاز الطبيعي مصدر طاقة مقبولا لتلبية الطلب على التدفئة في العديد من البلدان المنتجة للغاز، ولا سيما في الجزائر، وتعمل الشركة الوطنية للهيدروكربونات (SONATRACH) حالياً بالتعاون مع فريقنا البحثي، على دراسة الإمكانيات الجيوحرارية الأرضية لبلدنا لضمان انتقال طاقة سلس لاستبدال الطاقة الأحفورية المشتقة من الهيدروكربونات. ومن هذا المنظور يتبلور الدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه الطاقة الجيوحرارية الأرضية في بلدنا.



الشكل 3: طرق استغلال الطاقة الجيوحرارية.



الشكل 2: الدورة الهيدروجيولوجية: التسرب، والجريان الجوفي، والتبادل الحراري الأرضي.

Geothermal Energy Type	Temperature	Primary Use
 Very Low Energy	< 25°C	Geothermal heat pumps (GHPs) for heating and cooling buildings.
 Low Energy	30-90°C	District heating, greenhouses, fish farming.
 High Energy	> 150°C	Electricity generation.

الشكل 3: أنواع الطاقة الجيوحرارية واستخداماتها.

على عكس الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، تتوفر الحرارة الأرضية على مدار 24 ساعة، بغض النظر عن الظروف الجوية، مع معامل تحميل يتجاوز 90%. يعتمد هذا الأداء الاستثنائي كلياً على الإلمام الهيدروجيولوجي بتدفقات السوائل العميقة.

الهيدروجيولوجيا في صميم عملية الاستغلال هذه، حيث تعمل المياه الجوفية كسائل رئيسي لنقل الحرارة، تنقل الحرارة من الأعماق إلى السطح. ويعتبر التدرج الجيوحراري (The Geothermal Grandien)، الذي يتوافق مع ارتفاع درجة الحرارة مع العمق (بمعدل 3 درجات مئوية لكل 100 متر في المتوسط)، المحرك الرئيسي لهذا المورد الطاق.

الهيدروجيولوجيا ليست مجرد أداة في خدمة الطاقة الحرارية الأرضية؛ بل هي العمود الفقري العلمي لها. يبدأ كل مشروع للطاقة الحرارية الأرضية وينتهي بدراسة هيدروجيولوجية دقيقة بدءاً من التقيب، ومروراً بنمذجة الخزانات، وصولاً إلى الرصد البيئي.

في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التحول الطاق، تتمتع الطاقة الحرارية الأرضية بميزة كبيرة على مصادر الطاقة المتجددة الأخرى واستمراريتها.

علم الهيدروجيولوجيا

ركيزة أساسية لفهم المياه الجوفية والطاقة الحرارية الأرضية

HydroGeology

Understanding Groundwater and Geothermal Energy


بقلم د. طارق درياس

قسم الجيولوجيا جامعة باتنة 2



يُعدّ علم الهيدروجيولوجيا، وهو علم المياه الجوفية، فرعاً أساسياً من فروع الجيولوجيا يهتم بتوزيع وحركة وخصائص المياه الموجودة في باطن الأرض. يجمع هذا التخصص -الذي يتسم بطبيعته بالتعددية التخصصية- بين مبادئ الجيولوجيا والهيدروجيولوجيا والفيزياء والكيمياء والرياضيات لتوضيح التفاعلات المعقدة بين المياه والتكوينات الصخرية. إلى جانب دورها الحاسم في إدارة موارد مياه الشرب، تلعب الهيدروجيولوجيا دوراً بارزاً في تطوير الطاقة الحرارية الأرضية، وهي مصدرٌ واعدٌ للطاقة المتجددة، وتحسينها. في هذا المقال نستكشف أساسيات الهيدروجيولوجيا ومفاهيمها الرئيسية، ونسلط الضوء على

علاقتها الوثيقة بالطاقة الحرارية الأرضية. الهيدروجيولوجيا هي أحد فروع علوم الأرض التي تدرس المياه الجوفية ووجودها وحركتها ونوعيتها داخل طبقات المياه الجوفية. وهي تعتمد على فهم عميق للجيولوجيا الهيكلية (الصدوع والكسور)، وعلم الرواسب (أنواع الصخور والمسامية)، وعلم الطبقات (ترتيب الطبقات الجيولوجية)؛ لتوصيف الخزانات الجوفية. تُعدّ المياه الجوفية مكوناً أساسياً في الدورة الهيدروجيولوجية العالمية، حيث تتسرّب من السطح، وتدور عبر الصخور المسامية والمتصدّعة، وتظهر أحياناً في شكل ينابيع. توضّح الصورة أدناه هذه الدورة، وتبرز المناطق المختلفة لتدوير المياه في باطن الأرض.



الشكل 1: مخطط يوضح الدورة الهيدروجيولوجية وحركة المياه بين الهطول، والجريان السطحي، وتسرب المياه إلى الخزانات الجوفية وتغذيتها.

الخصائص الأساسية التي تحكم سلوك المياه الجوفية هي المسامية والنفاذية. تمثّل المسامية نسبة الفراغات في الصخور، مما يحدّد قدرتها على تخزين المياه. أمّا النفاذية، فهي تقيس سهولة تدفق المياه عبر هذه الفراغات. «قانون دارسي» (Darcy's law) هو المبدأ الأساسي الذي يصف تدفق المياه في الأوساط المسامية، ويحدّد العلاقة بين التدفق، والتوصيلية الهيدروليكية (مقياس للنفاذية)، ومساحة التدفق، والتدرج الهيدروليكي.

نحو طاقة حرارية أرضية مستدامة

تستغلّ الطاقة الحرارية الأرضية الحرارة الداخلية للأرض، وهي طاقة متجددة وثابتة. وتقع



الشكل 1: صفحة من مخطوطة «استخراج ما بين المركز من المجسطي» لأبي نصر بن عراق، تتضمن رسماً فلكياً ونصاً يوضح حساب موضع الشمس وفق الأساليب الفلكية الإسلامية.

- رسالة في «براهين أعمال جدول التقويم في زيج حبش الحاسب».
- رسالة في «ضميمة كتاب الأصول».
- مقالة في «رؤية الأهلة».
- «إصلاح كتاب منلاوس في الأشكال الكريّة».
- كتاب «تهذيب التعاليم».
- كتاب «المجسطي الشاهي».
- «استخراج بعد ما بين مركزين من المجسطي الشاهي».
- «الدوائر التي تحدّد الساعات الزمنية».
- رسالة في «البرهان على حقيقة مسألتين وقعتا بين أبي حميد الصنعاني وبين منجمي الري».
- رسالة في «صناعة الأسطرلاب بالطريق الصناعي».
- رسالة «الأسطرلاب السرطاني المجنح في حقيقته بالطريق الصناعي».



الشكل 2: إسطرلاب فلكي يُستخدم لرصد الأجرام السماوية وحساب الزمن والإحداثيات.

ابن عراق وعلم الفلك

كان ابن عراق ناقدًا ومحققًا في حقل علم الفلك، فقد صحّح مثلاً مؤلفًا للرياضي والفلكي الشهير أبي جعفر الخازن (ت. 349هـ/960م)، وهو الكتاب المسمى «زيح الصفائح»، فنال شهرةً واسعةً عند معاصريه. قام ابن عراق بهذا التصويب، وهو يعي جيدًا مكانة أبي جعفر الخازن، ويشير في هذا السياق إلى أنّ الخازن نفسه قد «استدرك على منلاوس» وأنّ بني موسى بن شاكر، رغم علوّ شأنهم، قد أخطأوا في بعض ما قدّموا بخصوص كتاب الإغريقي أبلونيوس (262ق.م-190ق.م) في المخروطات «رغم جلالة قدر ذلك الكتاب».

وعندما تحدّثت مؤرّخة العلوم ماري تريز ديبارنو Marie-Thérèse Debarnot عن مسألة القبلية وبعض المؤلّفات التي ظهرت فيها حسابات مبتكرة ذات الصلة بنظرية منلاوس المسماة «نظرية رباعي الأضلاع (الكروي) التام»، قالت: «ويبقى من هذه النصوص تلك التي كتبها أبو نصر بن عراق وأبو الوفاء البوزجاني. ويُعدّ هذان العالمان مع أبي محمود الخنجدي من أعظم الباعثين للتجديد الذي حصل في نهاية القرن العاشر الميلادي».

وكان البيروني تناول بإسهابٍ في كتابه «مقاليد علم الهيئة» القضية المتعلقة بمن هو السّباق، إلى معالجة مسألة سُمّت القبلية بطريقة جذرية: أهو الخنجدي أو أبو الوفاء البوزجاني أو ابن عراق؟ يقول البيروني في هذه المسألة: «قد كان اجتمع عند أبي سعيد بن محمد بن عبد الجليل (المعروف بالسجزي) عدّة طرق لفضلاء المهندسين وأصحاب الزيجات في استخراج سمت القبلية بالحساب والتقدير المساحي بالآلات، مختلفة النتائج، عديمة البراهين. وأعلمته أنّ مولاي ومصطعني أبا نصر منصور بن علي بن عراق – أيّده الله – شديد القوى على استخراج براهين أمثالها من الحساب، بعيد الغور فيها، سريع الإدراك لها. فسألني مطالبته بتأملها، وإزاحة العلّة في تحقيقها، والكشف عن دواعي أصحابها إليها. ففعلت وعمل أبو نصر في ذلك السّؤال كتابًا وسقاه بالسموت، وأودعه المطلوب منه، واستنبط في مواضع من ذلك الكتاب لوازم هذا الشكل، من غير قصد منه له إلّا لما احتاج إليه». ولمّا علّم البوزجاني بهذا الكتاب راسل البيروني من بغداد وأكّد «استحسانه الكتاب واستعظامه إياه»، لكنّه أعاب على صاحبه ابن عراق استخدامه طرق

أبو النصر منصور بن عراق

رائد الهندسة الكروية والفلك الرياضي

Abu al-Nasr Mansur ibn Iraq
Pioneer of Spherical Geometry and Mathematical Astronomy


















بقلم د. أبو بكر خالد سعد الله

المدرسة العليا للأساتذة - القبة



أبو النّصر منصور بن علي بن عراق رياضي وفلكي، ذاع صيته ابتداءً من القرن 4هـ / 10م. وُلد بمدينة خوارزم، ولذا يلقّب أحياناً بالخوارزمي. وقد درس العلوم، وانشغل بالرياضيات، وعلم الفلك حتّى لفت أنظار علماء عصره. تبرز أهمية أعمال ابن عراق العلمية في اهتمامه بتطوير ما يُعرف اليوم بالهندسة الجبرية والهندسة الكروية، وذلك بلجوئه مع علماء آخرين إلى استخدام القطوع المخروطية في حلّ بعض المسائل الجبرية. كما انشغل بالآلات الفلكية وتصحيح الأخطاء الواردة في النظريات التي أخذ بها الفلكيون الذين سبقوه.

ورغم مكانة ابن عراق فإن المؤرخين يلاحظون ندرة المعلومات المتاحة حول حياته الشخصية. ويعترف مؤرّخ العلوم قدري حافظ طوقان (1910-1971م) بذلك حيث يقول: «لم نتمكّن من العثور على تاريخ ولادة صاحب الترجمة (ابن عراق)، أو تاريخ وفاته، على الرّغم من التحرّيات الكثيرة، لكنّه ولا شكّ كان من رياضي القرن الرّابع للهجرة، وكان حيّاً حوالي سنة 1000م».



ومن المعلوم أنّ أبا نصر قضى فترة طويلة يفكّر كيف يمكنه بناء مرصد ومدرسة لطلّاب العلم في مسقط رأسه. ولتحقيق هذا المسعى تقرب من حكّام خوارزم إلى أن حظي بثقتهم. وهكذا لبّى طلبه الملك أبو العبّاس علي بن مأمون بن محمد خوارزمشاه، فتحقّق حلم ابن عراق، وأنشأ مرصداً ومدرسةً في خوارزم. وفي هذه المدرسة تتلمذ على يديه أبو الريحان البيروني (362هـ/973م-440هـ/1048م)، والذي كان يهدي مؤلفاته لأستاذه.

وظلّ البيروني يكتّن التقدير والإجلال لابن عراق فكان يلقّبه بأستاذي حتّى في كتبه ومؤلفاته. والواقع أنّ هذا الاحترام كان متبادلاً بينهما، وكان ابن عراق أيضًا يهدي مؤلفاته لتلميذه. فتوطدت العلاقات بين العالمين حتّى صارا صديقين حميمين. وقد مكث ابن عراق في خوارزم حتّى دخل السلطان محمود الغزنوي خوارزم عام 407هـ / 1016م فأخذ معه ابن عراق والبيروني إلى مدينة غزنة. فعاش ابن عراق هناك حتّى وفاته نحو عام 427هـ / 1036م.

لم يترك ابن عراق أعمالاً تمتش جميع المعارف بل اختصّ في علم الفلك، مركزًا على جانبها الرياضي وعلى الهندسة. وكان له الفضل في القيام بأول ترجمةٍ كاملةٍ لكتاب «الأكر» (Spherics) لمنلاوس الأسكندراني Menelaus. ذلك أن أسلافه تخلّوا عن جزءٍ من هذا العمل بسبب بعض الصعوبات التي واجهوها في المقالة الثّالثة من الكتاب. وتُعدّ ترجمة ابن عراق أوضح وأدقّ ترجمةٍ للنصّ اليوناني المفقود إلى يومنا هذا.

ومن اهتمامات منلاوس في هذا الكتاب، العلاقات التي تربط أطوال أضلاع المثلث الكروي، وقياس زواياه، ومسائل أخرى. وعلى الرّغم من أنّ الكتاب يبدو رياضياً محصّناً فإنّ جزءاً كبيراً من محتواه كان يتناول مواضيع وثيقة الصّلة بعلم الفلك مثل حساب إحداثيات الشمس، وتصميم جداول فلكية (أزياج)، ودراسة حركة الشّمس، وحساب المسافات بين الكواكب، وهو ما لفت نظر علماء الفلك العرب والمسلمين، وفي هذا الكتاب أثبت منلاوس أوّل مبرهنةٍ في حساب المثلثات الكروي تحمل اسمه وتُسمّى أيضًا: «مبرهنة رباعي الأضلاع (الكروي) التام» أو «الشكل القطاع».

لقد ترجم ابن عراق عمل منلاوس وأبدع فيه حيث صوّب أخطاءً عديدةً واردةً في عدّة قضايا من الكتاب، سواء في نصّ النتائج أو في براهينها. فعلى سبيل المثال، نجد ابن عراق يقول في نقده لإحدى المتبانيات: «فأما وإن تبيّن أنّ نسبة جيب ج ز إلى جيب زد أعظم من نسبة جيب ج ح إلى جيب ده فإنّه ليس من ذلك وحده تبيّن أن نسبة قوس ج ح إلى قوس ده أصغر من نسبة جيب ج ز إلى جيب زد».

وبعد ذلك يقدم ابن عراق برهانه.

BIOLOGY


توصل باحثون إلى أن أصداف المحار كانت سببا في تحسين جودة المياه في خليج المكسيك، واستعادة التنوع البيولوجي الساحلي إضافة إلى إعادة بناء شعاب المحار البحري التي تدهورت على مدار السنين. فبين عامي 2007 و 2024 أعادت ولاية فلوريدا أكثر من 500 ألف طن من أصداف المحار والمحار البحري المعاد تدويرها إلى خليج المكسيك، بعد جمعها من المطاعم ومصانع معالجة المأكولات البحرية، بدلاً من التخلص منها مع النفايات. رغم تعرض المشروع لعدة انتقادات باعتباره مجرد إلقاء نفايات في البحر إلا أنه وبعد عقدين من الزمن تمكن العلماء من حصد نتائج مذهلة. إذ غطت البكتيريا الأصداف بطبقة حيوية (Biofilm)، والتي تعتبر بيئة مناسبة لاستقرار ونمو كائنات بحرية أخرى. كما أدى تحليل الأصداف تدريجيًا في إطلاق الكالسيوم إلى المياه، مما هيا ظروفًا كيميائية ملائمة لعدد كبير من الكائنات البحرية. وهذا ما حسن أيضًا جودة المياه، لأن المحار يعمل طبيعيًا على ترشيح مياه البحر. كما وجد الباحثون علاقة بين استعادة الشعاب وانخفاض ازدهار الطحالب الضارة، وتحسن الظروف البيئية التي تدعم تنوعًا أكبر من النباتات والحيوانات البحرية.



أصداف تتحول إلى موطن بحري يحتضن آلاف الأنواع من الكائنات البحرية

NEUROSCIENCE

تعلم 25 شخصًا الطيران بأجنحة افتراضية... كيف تغيّرت أدمغتهم؟



أظهرت دراسة نُشرت في مجلة Cell Reports أن تدريب الأشخاص على استخدام أجنحة افتراضية يجعل أدمغتهم تستجيب للأجنحة بطريقة أقرب إلى استجابتها للأطراف الحقيقية، مما يجعل هذه الأجنحة تبدو وكأنها جزء من أجسامهم وهذا ما يبين بوضوح مدى مرونة الدماغ البشري. فإذا كان الدماغ قادرًا على دمج شيء غير بشري كالجنح ضمن تمثيله للجسم، فمن المحتمل أن يكون قادرًا أيضًا على دمج أنواع أخرى من الأطراف. وقام ييانغ كاي (Yiyang Cai) بتصميم برنامج تدريبي استمر أسبوعًا كاملًا، مستندًا إلى المبادئ الميكانيكية لطيران الطيور. وارتدى خلاله المشاركون خوذات الواقع الافتراضي وأجهزة تتبع الحركة، ليشاهدوا أنفسهم عبر مرآة افتراضية، على هيئة كائنات تشبه الطيور، تمتلك أجنحة كبيرة مكسوة بريش ذي لون بني مائل إلى الحمرة. وعندما يدير هؤلاء الأشخاص معاصمهم ويحركون أذرعهم بحركة الرفرفة، كانت الأجنحة تتحرك بالتزامن مع حركاتهم. خلال سلسلة من المهام التدريبية، تعلم 25 مشاركًا تدريجيًا التحكم في أجنحتهم الافتراضية. فقد استخدموها لإبعاد كرات هوائية متساقطة، والحفاظ على التحليق فوق منحدرات شاهقة، بل وحتى توجيه أنفسهم للطيران عبر حلقات معلقة في الهواء. وبعد انتهاء البرنامج التدريبي، لاحظ الباحثون أن أجزاءً من المنطقة المسؤولة عادةً عن الاستجابة لصور أجزاء الجسم المعروفة بالشرة البصرية، بدأت تستجيب بصورة أقوى لصور الأجنحة المختلفة، كما أصبحت استجابتها للأجنحة تشبه استجابتها للأطراف العلوية. وتشير هذه النتيجة إلى قدرة الدماغ، على إعادة تنظيم نفسه قد تكون أوسع بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

بقلم: جمال ميموني، الشيماء أمين خوجة
وحدة البحث في الوساطة العلمية - CERIST

بأبارتزي العلوم



آخر المستجدات العلمية

كتابة 100 كلمة باستخدام ChatGPT تستهلك زجاجة مياه!



أظهرت دراسة حديثة، أن كتابة رسالة بريد إلكتروني واحدة من 100 كلمة باستخدام تطبيق ChatGPT، تستهلك ما يقارب حجم زجاجة مياه. وبيّنت ورقة بحثية بعنوان «جعل الذكاء الاصطناعي أقل عطشًا» نُشرت في مجلة Communications of the ACM وأُعدّها باحثون في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد، أنه من المتوقع أن تستهلك البنية التحتية العالمية التي تعالج استفسارات الذكاء الاصطناعي ما يعادل نصف كمية المياه التي تسحبها المملكة المتحدة سنويًا بحلول عام 2027، بينما يُستخرج جزء كبير من هذه المياه من مناطق تعاني أصلاً من جفاف شديد. وتبلغ كمية المياه اللازمة لكتابة رسالة من 100 كلمة نحو 519 مليلترًا، وهو حجم قريب بما يكفي من زجاجة مياه قياسية. ويشمل هذا الرقم المياه المستخدمة مباشرة لتبريد خوادم مركز البيانات، والمياه المستخدمة بصورة غير مباشرة لإنتاج الكهرباء التي تستهلكها تلك الخوادم. ويقدر فريق البحث نفسه أن المحادثة الواحدة المستمرة مع روبوت دردشة، والمُعرّفة بأنها تتكون من 10 إلى 50 تبادلًا، تستهلك كمية مياه تقارب 500 مليلتر. ويزداد هذا الرقم بالمقدار نفسه كلما امتدت المحادثة. وأصبحت مراكز البيانات الحديثة، التي بُنيت خصيصًا لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أكبر حجمًا وأكثر كثافة وأعلى إنتاجًا للحرارة، لذلك بات بإمكان مجمع واحد ضخّم لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي فائقة النطاق أن يستهلك في يوم واحد كمية من المياه تفوق ما تستخدمه بلدة يبلغ عدد سكانها عشرة آلاف نسمة في جميع احتياجاتها.

EARTH & CLIMATE

روبوتات ذاتية القيادة تستكشف الصفائح الجليدية الخطرة في غرينلاند



تستعد بعثة علمية هذا الصيف لإطلاق عدد من الروبوتات والطائرات ذاتية القيادة والغواصات غير المأهولة وأجهزة الاستشعار إلى غرينلاند، بهدف دراسة ذوبان الجليد بدقة غير مسبوقة. وتندرج هذه المهمة ضمن مشروع GIANT، الذي يهدف إلى جمع بيانات ميدانية تُستخدم لتحسين النماذج المناخية التي تساعد العلماء وصناع القرار على التنبؤ بالتغيرات المحتملة في التيارات المحيطية الكبرى التي تسهم في تنظيم مناخ الأرض الذي يساعد على التنبؤ بمستقبل ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيراته المحتملة على المجتمعات الساحلية حول العالم. ويأمل العلماء في تطوير نظام إنذار مبكر يرصد التغيرات الخطيرة في الأنهار الجليدية قبل وصولها إلى نقطة اللاعودة. فالمنطقة التي يلتقي فيها الجليد بمياه البحر تُعد من أخطر البيئات الطبيعية وأكثرها تعقيدًا، إذ تنهار كتل جليدية ضخمة بصورة مفاجئة، بينما تتشكل تحت الماء تيارات ودوامات تجعل الاقتراب من موقع الذوبان أمرًا شديد الخطورة على الباحثين. لهذا ستستعمل البعثة طائرات مسيّرة لتصوير الأنهار الجليدية من الجو، وقوارب وغواصات روبوتية لمسح الأجزاء المغمورة تحت سطح الماء، بالإضافة إلى أجهزة استشعار تُثبت مباشرة داخل الجليد لقياس درجة الحرارة، وشدة الاضطرابات المائية، ومعدل الذوبان في الزمن الحقيقي. كما سيستخدم الفريق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتوفرة وتحديد أفضل المواقع لنشر هذه الأجهزة، مما يسمح بسد الفجوات في القياسات وتحسين فهم العمليات التي تتحكم في ذوبان الجليد. ويأمل الباحثون أن تسهم هذه البيانات في تطوير نماذج مناخية أكثر دقة.

عدسة هواة الفلك

مغامرة فلكية في قلب صحراء الجزائر رحلة بين النجوم والنقوش الصخرية

بقلم عمر عبد الوهاب




مصور فلكي، ورئيس قسم الفلك بجمعية مصطفى محمود- مصر

في رحلةٍ لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل ارتحالًا في أعماق الشَّغف البشري بالسماء، حطّطت رحالي في أرض الجزائر، كان ذلك في ماي 2025. لطالما كان الفلك هو اللّغة الموحّدة الّتي نتحدّث بها جميعًا كأبناءٍ لهذا الكون، وفي هذه الزيارة، كانت وجهتي الأولى هي مدينة قسنطينة، مدينة الجسور المعلّقة، والّتي ترتفع وكأنّها تُحاول ملازمة النّجوم، لتكون نقطة الانطلاق لحدثٍ استثنائي.



PHYSICS



هل تستطيع مفاعلات الاندماج النووي كشف سر المادة المظلمة؟

اقترح فريق دولي من الفيزيائيين طريقة نظرية جديدة قد تُمكن مفاعلات الاندماج النووي من إنتاج جسيمات افتراضية تُعرف باسم الأكسيونات (Axions)، وهي من أبرز المرشحين لتفسير المادة المظلمة التي يُعتقد أنها تشكل معظم مادة الكون. ونشرت الدراسة في مجلة Journal of High Energy Physics، حيث يّين الباحثون أن النيوترونات عالية الطاقة الناتجة عن تفاعلات الاندماج داخل المفاعل قد تتفاعل مع جدرانه أو مع جسيمات


أخرى، مما قد يؤدي إلى إنتاج الأكسيونات أو جسيمات مشابهة لها. وإذا أمكن رصد هذه الجسيمات مستقبلاً، فقد تمثل خطوة مهمة نحو فهم طبيعة المادة المظلمة. ومن الطريف أن هذه الفكرة ظهرت قبل سنوات في المسلسل الشهير The Big Bang Theory، عندما حاولت شخصيتا شيلدون كوبر وليونارد هوفستاتر إثبات إمكانية إنتاج الأكسيونات داخل مفاعل اندماج، إلا أن حساباتهما انتهت بالفشل. ويشير أحد مؤلفي الدراسة، البروفيسور يوري زوبان من جامعة سينسيناتي، إلى أن فريقه تمكن أخيرًا من إيجاد آلية نظرية مختلفة قد تجعل ذلك ممكنًا. ورغم أن الشمس تُعد مصدرًا أكثر كفاءة لإنتاج الأكسيونات عبر العمليات النووية الطبيعية، فإن الباحثين يعتقدون أن مفاعلات الاندماج قد توفر بيئة تجريبية محكمة تسمح بدراسة هذه الجسيمات مباشرة، مما قد يفتح نافذة جديدة للبحث في أحد أكبر ألغاز الفيزياء الحديثة.



SPACE WEATHER

هل يوجد رابط بين العواصف الشمسية

وحدوث الزلازل الأرضية؟



توصلت دراسة جديدة من جامعة كيوتو إلى أن العواصف الشمسية قد تؤثر بشكل غير مباشر في حدوث بعض الزلازل. حيث اقترح الباحثون نموذجًا نظريًا جديدًا يفترض أن النشاط الشمسي القوي يغيّر الشحنة الكهربائية في الأيونوسفير، مما قد يولد مجالات كهربائية تنتقل إلى مناطق الصدوع الضعيفة في القشرة الأرضية. وإذا كان الصدع الجيولوجي قريبًا أصلًا من الانهيار، فقد تساهم هذه الضغوط الكهربائية الإضافية في تحفيز حدوث الزلازل. ويؤكد الباحثون أن هذا النموذج لا يعني أن العواصف الشمسية تسبب الزلازل مباشرة، ولا يمكن استخدامه للتنبؤ بالزلازل، بل يقدم آلية فيزيائية محتملة تفسر كيفية تفاعل طقس الفضاء مع الصدوع الجيولوجية المهمة للانهيار. كما أشار الفريق إلى أن بعض الزلازل القوية في اليابان، وقعت بعد فترات شهدت نشاطًا شمسيًا مرتفعًا مثل زلزال شبه جزيرة نوتو عام 2024. ومع ذلك، شدد الباحثون على أن هذا التزامن لا يثبت وجود علاقة حتمية سببية، وإنما قد يشير إلى عامل إضافي يستحق المزيد من الدراسة. ويسعى الفريق في أبحاثه المستقبلية إلى دمج بيانات الأيونوسفير وطقس الفضاء مع القياسات الجيولوجية، لمعرفة ما إذا كانت هذه الاضطرابات تؤدي بالفعل دورًا في التأثير على استقرار الصدوع الزلزالية.



تادارات الحمراء في قلب الطاسيلي، حيث تعانق الأقواس الصخرية درب التبانة في أحد أنقى سماءات العالم.

الأسطورية الممتدة جنوب شرق الجزائر على بعد نحو 2200 كيلومتر في قلب صحراء التاسيلي. تشتهر تادارات الحمراء بتكويناتها الصخرية الخرافية التي تشبه منحوتات فنية ضخمة من كوكب آخر، وكأنها مسرح مفتوح لحكايات الزمن السحيق. المنطقة جزء من حديقة الطاسيلي الوطنية، وهي مُدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتشتهر بمناظرها الطبيعية التي دفعت كثيرين إلى تشبيهها بسطح كوكب المريخ.

تعتبر الطاسيلي القريبة من تادارات، أغنى متحف مفتوح لفن ما قبل التاريخ في العالم، حيث تحتوي على أكثر من 15000 لوحة ونقش صخري تعود إلى ما بين 10000 إلى 2000 سنة قبل الميلاد، وهي في الأساس عبارة عن مناظر صيد لحيوانات ضخمة من فيلة، زرافات، وأبقار. كما تضم رموزا فلكية يعتقد بعض الباحثين أنها مرتبطة بتتبع النجوم أو دورات القمر، إضافة إلى رسومات مدهشة لكائنات بشرية بملامح غريبة، ما بين تفسيرات رمزية، دينية، أو حتى من وحي الخيال العلمي.

حدث فلكي نادر

ومن صحراء الجزائر رصدت أنا والصديق فيصل دمري حدثا فلكيا نادرا، تحديدا على بعد 15 كيلومترا من أكاكوس على الحدود بين الجزائر وليبيا. كنا نوجه الكاميرات في اتجاه الجنوب الشرقي في انتظار شروق المجرة، وكان فيصل يصور الأذبال النجمية في اتجاه الشمال. وعندما



الرسومات الصخرية في الطاسيلي ناجر، سجل بصري يوثق حياة الإنسان والحيوان في الصحراء منذ آلاف السنين.

تادارات الحمراء...

بدعوةٍ كريمةٍ من جمعية الشُّعرى لعلم الفلك، إحدى أنشط وأعرق الجمعيات الفلكيّة العربية، تشرّفُ بالمشاركة في فعاليات مهرجان علم الفلك الجماهيري في الجزائر. ما أدهشني هناك لم يكن فقط روعة التنظيم، بل تلك اللّمعة في عيون الحضور. شباب، أطفال، وعائلات بأكملها جاؤوا ليتشاركوا النظر عبر التلسكوبات، ويتساءلوا عن أسرار الكون. لقد عايشَت زخما علميا شاركت فيه ثلّة من العلماء من ربوع العالم، وقدّمتُ ورشة عمل متخصصة في «التصوير الفلكي». حاولنا معًا كسر الحواجز التقنية المعقّدة، ونقلُ للمشاركين خلاصة تجاربي في اقتناص ضوء النّجوم الباهت باستخدام الكاميرات والمعدّات الفلكية المتخصصة. كانت نقاشاتنا حول المعالجة، وتتبع الأجرام السماوية تعكس تعظُّشا حقيقيا لدى الشّباب الجزائري لتوثيق جمال السّماء. في قسنطينة التقيتُ بالصديق المصور الفلكي فيصل دمري، عضو جمعية الشعرى لعلم الفلك، وقرّرنا أن نفوص في رحلةٍ غربيّةٍ وعجيبة في صحراء الجزائر لاستكشاف والتصوير الفلكي.

مغامرة فلكية في قلب الصحراء الجزائرية: رحلة بين النجوم والنقوش الصخرية

على الصخرة، فغاب عن وعيه، وعندما استيقظ كان محاطًا بكائنات نورانية، لا هي بشر ولا آلهة، وجوهم بلا ملامح وأعينهم تشع بنبض سماوي. قالت له: «لقد اخترناك، يا ابن الرمال، لتحمل نور السماء إلى الأرض، لكن النور لا يُعطى مجانًا.. عليك أن تعيش ألف عام دون أن تُرى.» منذ تلك اللحظة، اختفى تينازروت. لكن كل من ينام تحت سماء تاسيلي، في الليالي التي تشتعل فيها المجرة كأنها شريط من الحكايات، قد يرى ظلًا يمرُّ، لا يترك أثرًا في الرمال.. يُسمونه «الظل السماوي». يقول الطوارق إن من يراه، يُمنح رؤية قلبه، فإن كان قلبه نقيًا، يرى ذلك النور، وإن كان ظله مثقلًا بالخوف، يضل في المتاهة الصخرية، ويختفي كما اختفى تينازروت.

غادرْتُ الجزائر تاركا ورائي بلدا يزخر بتنوع لا يمكن أن يجتمع إلا في الأساطير: جبال تُنبت الحكمة، غابات تهدئ الروح، ومدنٌ تكاد أن تنطق بالجمال، لكنّ الروح؟ الروح وجدت مرساها في مكانٍ آخر.. في الصحراء.

في صحراء الجزائر، رأيت الأرض تصمت لتتكلم السماء. وهناك، حين انفردت بالكون، شعرت أن النجوم لم تكن نقاظًا من ضوء، بل رسائل، وأن رحلي لم تكن استكشافًا لبلد.. بل كشفًا لحقيقةٍ في داخلي.



رأيت هذا القوس الأبيض الغريب، ناديت بسرعة على فيصل ليراه. في البداية ظننت أنه سحابة بيضاء أو بخار ماء خلفته طائرة، ولكننا اكتشفنا أن الأمر يتعلق بعاصفة شمسية مفاجئة أضاءت السماء بقوس أبيض نادر. ففي فجر يوم 17 ماي 2025، حصلت عاصفة مغناطيسية مفاجئة على كوكب الأرض، رغم أن العلماء لم يتوقعوا حدوثها. السبب كان كتلة غازية ضخمة انفجرت من الشمس.

وبحسب الأسطورة فإن تينازروت وضع يده

بمجرد أن اصطدمت الكتلة الشمسية بالغلاف المغناطيسي للأرض، بدأت الجسيمات المشحونة تدخل الغلاف الجوي وتسبب تفاعلات نتجت عنها أضواء الشفق القطبي (Aurora) التي لم تُر في صحراء الجزائر، لكن المفاجأة هي أن الظاهرة شوهدت في أماكن بعيدة جدًا عن القطبين، مثل ولاية نبراسكا في أمريكا!

سر «الظل السماوي» في صحراء تاسيلي

وفي قلب صحراء تاسيلي ناجر، تلك الرقعة السحرية من الأرض التي تحتضن آلاف الرسوم والنقوش الغريبة، وتهمس صخورها بأسرار الزمن، تناقلت قبائل الطوارق حكاية قديمة، لا ترونها إلا نار المخيم تحت سماءٍ مرصعة بالنجوم. تقول الأسطورة إنه في زمنٍ بعيد، سكن أحد الوديان المقدسة في تاسيلي رجل يُدعى تينازروت، وكان حكيم القبيلة، ومرشد النجوم. قيل إنه كان يبصر ما لا يُبصر، ويحدّث الرياح، ويقرأ رسائل ما في



الرسامة الفلسطينية

فاطمة علي أبو عودة

“

يا ابن أكثر من أب،

كم كُنت وحدك

القمح مُر في حقول الآخرين

والماء مالح

والغيم فولاذٌ. وهذا النجم جارحٌ

وعليك أن تحيا وأن تحيا

وأن تعطي مقابل حبة الزيتون جلدك

كم كُنت وحدك

محمود درويش

“

Son of more than my father

How alone you were

The wheat is bitter

In the fields of others

And the water tastes of salt

The clouds are steel

And this star can scar

And you have to live and be alive

And in exchange for an olive

Have to give your skin

How alone you were

Mahmoud Darwish



إشراف: د. جمال ميموني و ياسمين بوالجدري



حتى لا ننسى فلسطين



دومينيك دوبار.

تقول دوبار إنَّ ما يحدث في غزّة يرسم صورةً لعالم ثقافي ينهار بالكامل، رغم ذلك، تُشير إلى أنَّ هناك بارقة أمل، ففي ماي 2025، أنشأ طلاب من غزّة مكتبةً رقميّةً بدائيّةً عبر جمع نسخ إلكترونية من المقالات والأبحاث لتعويض فقدان مكتباتهم.

إنشاء مكتبة افتراضية

حدّدت مبادرة غزّة تقرأ ثلاثة مجالات رئيسيّة تلتزم من خلالها بالعمل على استعادة القراءة، أوّلها إنشاء مكتبة افتراضية تُعوّض آثار تدمير خوامد الجامعات والمكتبات في غزّة، وذلك من خلال توفير موارد إلكترونيّة على منصّة رقميّة خفيفة يسهل الوصول إليها عبر الهواتف الذكية، بحيث تحتوي على مواد قراءة مخصّصة لمختلف الفئات، مثل الأطفال، وطلاب الجامعات، ومتعلّمي اللغات الأجنبية. ومن شأن هذه المكتبة أن تُساهم في استعادة شروط التعليم على جميع المستويات، ودعم الطلاب الذين

يتعلّمون اللغات الأجنبية عبر الإنترنت.

عليها، إلى القيام بجدد شامل قدر الإمكان لتوثيق تدمير الأماكن التي تُنتج، وتُحفظ، وتُخزّن، وتُشرّ فيها الكتب والمواد المكتوبة الأخرى، وكذلك توثيق المواد المكتوبة التي دُمّرت أو تضرّرت منذ أكتوبر 2023. ويتضمّن هذا الجرد تفاصيل دقيقة حول تاريخ وتدمير كلّ مؤسسة أو مجموعة، من تاريخ الإنشاء، تاريخ التدمير، التحديد الجغرافي، الخلفية التاريخية، المواد والأنشطة التي كانت تُمارس، التوثيق الفوتوغرافي، الشهادات، وغيرها.

ويهدف هذا الجرد أيضًا إلى تقييم احتياجات طلاب الجامعات في غزّة من حيث القراءة، ورسم خريطة شاملة لكلّ الأماكن المرتبطة بالقراءة التي تمّ تدميرها، كتمهيد لمرحلة إعادة الإعمار القادمة، علماً أنّ نحو 4000 طالب يواصلون دراستهم بفضل البرامج التي وضعتها مبادرة التضامن الأكاديمي مع فلسطين.

ويُجرى هذا التقييم بشكل مستمر بالتعاون مع قراء غزّة، سواءً من هم على الأرض أو في المنفى، بحيث يوجّه القائمين على المبادرة عملية استعادة جميع المعلومات المتعلّقة بالمباني والمجموعات التي فُقدت، بالإضافة إلى تكريم أمناء المكتبات والأرشيف الذين استشهدوا، وكذلك كلّ من استخدم أو أنشأ أو عمل مع المواد المكتوبة، ممّن لقوا حتفهم أو لا يزالون يموتون نتيجة القصف، أو الأمراض، أو المجاعة. يعمل مشروع «غزة تقرأ» أيضًا على تطوير استراتيجية، ومناصرة، وحشد كل القطاعات المرتبطة بالكتب وعالم الكتابة، ممّن هم على استعداد للتعاون ودعم الجهود المبذولة.



جرد شامل لأماكن القراءة المدمّرة

كما تهدف مبادرة «غزة تقرأ» بحسب القائمين




ياسمين بوالجدرني

متخصصة في الإعلام العلمي

مبادرة «غزة تقرأ».. معركة من أجل إنقاذ الذاكرة

لا تُستهدف المباني وحدها في الحروب، بل تُستهدف أيضًا الذاكرة والمعرفة وكل ما يُمْنح الإنسان القدرة على التفكير والأمل. وفي غزّة؛ لم يقتصر الدمار على المنازل والبنية التحتية، بل امتدّ ليطال المكتبات والجامعات ودور النّشر، مُهدّدًا بإلغاء أحد أهمّ مقوّمات الحياة الثقافية والتعليميّة. من قلب هذه المأساة وُلدت مبادرة «غزة تقرأ»، بوصفها استجابةً ثقافيّةً وإنسانيّةً تسعى إلى إعادة الحقّ في القراءة لشعبٍ يعيش تحت وطأة حرب لا تعترف بأيّ حدود.



رسم توضيحي لمكتبة فرع شمال غزة التابع لجامعة القدس المفتوحة قبل تدميرها. آيسيجول نعيم العالم.

من غزّة وأوروبا والولايات المتّحدة، قرّر نحو ثلاثين شخصًا، التطوّع من أجل إنقاذ ذاكرة أماكن القراءة والكتابة في غزّة التي دمرها الجيش الإسرائيلي، فأنشؤا مشروع «غزة تقرأ»، والذي يُعتبر ردًّا على تدمير الكتب والثقافة القرائية في القطاع. جميع أنواع المكتبات والأرشيف في المدارس، والمراكز الثقافية، والمباني البلدية، والجامعية والتاريخية، إلى جانب دور النشر، والمطابع، والمكتبات التجارية، وحقّ المقاهي الأدبية، استُهدفت بشكل واسع ومنهجي في غزّة، بدءًا من الأسبوع الذي تلا السابع أكتوبر 2023 مباشرةً، فمنذ 9 أكتوبر، تعرّضت المكتبة المركزيّة للجامعة الإسلاميّة وأرشيف قصر العدل للقصف، ومنذ ذلك الحين، تواصلت عمليات التدمير.

لقد أدّت الحرب إلى اختفاء عشرات الآلاف من الكتب والنصوص والوثائق والأعمال المكتوبة وسط أنقاض المباني التي تمّ قصفها أو تفخيخها، كما دُمّرت الصحف، السجّلات الأرشيفيّة، المخطوطات، مقتنيات التراث، وكتب الأطفال، والكتب المدرسية والجامعية، بل وحقّ النوات الموسيقيّة، والقصائد. إضافةً إلى كلّ هذا، تعمّد الاحتلال تخريب خوامد الحواسيب ممّا يعني استحالة الوصول إلى الموارد الرقميّة، وإفناء شكل آخر من أشكال القراءة.

قدور فارغة تختصر مأساة إنسانية

أزمة الغذاء تُفاقم معاناة النازحين في غزة

ياسمين بوالجدري

متخصصة في الإعلام العلمي



في مخيم جنين للنازحين بخان يونس جنوب قطاع غزة، يتجفّع عشرات الرجال والأطفال وهم يحملون قدورًا فارغة، مطالبين المنظمات الدولية بمواصلة تقديم المساعدات وعدم التخلي عن النازحين الذين يواجهون ظروفًا قاسية.

لقد أثار قرار منظمة المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen - WCK) تقليص توزيع وجباتها الساخنة في قطاع غزة إلى النصف، من نحو مليون وجبة يوميًا إلى 500 ألف وجبة بسبب «ضغوط مالية متزايدة»، احتجاجات بين الفلسطينيين الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المساعدات في ظل أزمة إنسانية وغذائية متفاقمة، لم تكن فيها الأواني الفارغة مجرد أدوات منزلية، بل تحولت إلى رمز لجوع يهدد حياة آلاف الأسر التي تنتظر وجبة قد تكون الوحيدة خلال يومها.

يؤكد سكان المخيم أن تقليص عمل المطبخ المركزي العالمي لا يعني فقط نقص عدد الوجبات، بل فقدان أحد أهم مصادر الدعم اليومي. فقد كانت المنظمة تدير مطابخ مجتمعية تخدم مخيمات النازحين، من بينها مخيمات تضم آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة.

لكن أزمة المساعدات في غزة لا ترتبط فقط بقدرة المنظمات الإنسانية على التمويل، بل تتصل أيضًا بالقيود المفروضة على دخول المساعدات وعمل المؤسسات الإغاثية. فقد أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية قواعد تسجيل جديدة وصارمة على منظمات الإغاثية الدولية العاملة في غزة والضفة الغربية المحتلة، ما أثار مخاوف من صعوبة استمرار العديد من الجهات الإنسانية في العمل.

وتشمل الإجراءات الجديدة تقديم قوائم تفصيلية بأسماء الموظفين، وهو ما رفضته بعض المنظمات خشية تعريض العاملين الفلسطينيين فيها للخطر. كما أن سلطات الاحتلال ألغت تراخيص عدد من الوكالات الإنسانية الكبرى بعد رفضها الالتزام بهذا.

الإجراءات، فيما حذرت منظمات الإغاثية من أن أي تراجع إضافي في عمل المؤسسات الإنسانية قد يؤدي إلى فراغ يصعب تعويضه، خصوصًا أن الاحتياجات في غزة تتزايد يوميًا بعد آخر.

ولا يقتصر تأثير تقليص عمل المطبخ المركزي العالمي على الجانب الغذائي فقط، إذ أدى القرار إلى فقدان مئات الفلسطينيين وظائفهم. فقد كانت المنظمة تشغل آلاف العمال في مطابخها المجتمعية، في قطاع وصلت فيه نسبة البطالة إلى أكثر من 80 بالمئة وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وقال أحد العاملين في المنظمة، خلال احتجاج نظمته موظفون فقدوا وظائفهم، إن القرار حرم عائلات كثيرة من مصدر دخلها، في وقت تعتمد فيه أسر عديدة بشكل كامل على الوجبات التي تقدمها المنظمة.

أما بالنسبة للأسر النازحة، فإن توقف هذه الوجبات يعني فقدان آخر ما تبقى من شبكة الأمان. تقول فاطمة عبد الله البسيوني، وهي أم فلسطينية نازحة في خان يونس: «في السابق، كان المطبخ المركزي العالمي يوفر وجبات، وكان الناس بالكاد يستطيعون تدبير أمورهم. كان الغذاء يصل، أما الفطور والعشاء فلم يكونا متوفرين إلا من



خلال المساعدات المحدودة للغاية.

الآن، إذا توقف المطبخ المركزي العالمي، فلن يكون هناك فطور ولا غداء ولا عشاء.

وفي الوقت نفسه، تشير تقارير محلية ودولية إلى استمرار النقص في دخول المساعدات إلى القطاع. فقد أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل فعليًا أقل بكثير من الأعداد المتفق عليها، وأن نقص الوقود يمثل أزمة إضافية تعيق مختلف جوانب الحياة.

كما وثقت الأمم المتحدة تدهور الوضع الغذائي، مشيرة إلى انخفاض تدفق المساعدات، وإلى أن العديد من العائلات أصبحت تعتمد على كميات محدودة جدًا من الغذاء. وأكدت المنظمة الدولية أن القيود المفروضة على المعابر ومنع دخول بعض الإمدادات الأساسية أدت إلى نقص مزمن في الغذاء والدواء



45 درجة مئوية تحت الخيام

إبادة بيئية متواصلة منذ قرن

تحت حرارة لاهبة تبلغ 45 درجة مئوية داخل الخيام، يعاني الفلسطينيون في غزة من ظروف معيشية لا تُطاق، تتفاقم بسبب الحصار الإسرائيلي الذي يُقيد بشدة الوصول إلى المياه والوقود ومواد البناء وإعادة الإعمار. ويُحذر العاملون في المجال الإنساني من العواقب الصحية الوخيمة، من الإرهاق والجفاف والتوتر الاجتماعي، وصولاً إلى احتمالية ارتفاع الوفيات بين كبار السن والأطفال، فيما يندد خبراء حقوق الإنسان بـ«فصل عنصري بيئي» يهدف إلى جعل الأراضي الفلسطينية غير قابلة للحياة.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية حيث يُقيد الماء بنحو 83 لترًا للفرد يوميًا، مقابل 165 لترًا للمستوطنين الإسرائيليين، مع حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى البحر والمساحات الطبيعية. وتُوصف هذه الممارسات بـ«الإبادة البيئية» من قبل المدافعين عن الحقوق، إذ لا تُعتبر هذه الإبادة البيئية وليدة اليوم، بل هي حلقة في مسلسل متواصل منذ الانتداب البريطاني، وبعقبتها الاحتلال الإسرائيلي الذي يتسبب في انهيار بيئي ممنهج.

يأتي ذلك في وقت كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن 67% من سكان غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي و10% يقتربون من المجاعة.

في مواجهة هذا التدمير، لا يبقى أمام الفلسطينيين سوى «الصمود» كشكل من أشكال المقاومة والتمسك بالأرض.

الشاطر الصغير

اكتشف • تعلم • تساءل

$$E=mc^2$$

$$F=G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$v=u+at$$



في هذا العدد

- 59 كيف بدأ الإنسان رحلته مع السماء!
- 60 تعرف على قصة حياة النجوم!
- 61 اختبر معلوماتك

إشراف:

الشيلاء أمين خوجة



كاريكاتير



تبادلنا الأدوار... دون أن ننتبه.

تعرف على قصة حياة النجوم

بقلم: خديجة طوبال

نادي العنقاء للفلك



ومع مرور الزمن يبدأ الوقود في النفاد وهنا تدخل القصة فصلها الأخير. فإذا كان النجم صغيراً أو متوسط الحجم، فإنه يتمدد ويصبح عملاقاً أحمر، ثم يفقد طبقاته الخارجية ويبرد تدريجياً حتى يتحول إلى قزم أبيض، وهو نجم صغير وساخن لم يعد قادراً على إنتاج الكثير من الطاقة.

أما إذا كان النجم ضخماً جداً، فإن نهايته تكون أكثر درامية. فعندما ينفد وقوده يحدث انفجار هائل يُسمى المستعر الأعظم. يضيء هذا الانفجار الفضاء بقوة مذهلة، ثم يترك وراءه شيئاً جديداً.

أحياناً يتكوّن نجم نيوتروني، وهو نجم صغير جداً لكنه شديد الكثافة بشكل لا يُصدق. ولتخيّل مدى كثافته، يمكننا أن نتخيل أن كتلة الأرض كلها تُضغَط حتى تصبح بحجم حبة بازلاء صغيرة. ورغم صغر حجمها، فإنها ستحتفظ بكتلتها الهائلة، لذلك يُعدّ النجم النيوتروني من أكثر الأجسام كثافة في الكون.

أحياناً يتكوّن ثقب أسود، وهو منطقة في الفضاء تمتلك جاذبية قوية جداً لدرجة أن أي شيء يقترب منها، حتى الضوء، لا يستطيع الهروب.

قد يبدو لك أن القصة تنتهي هنا، لكنها في الحقيقة لا تنتهي أبداً. فبقايا النجوم المنفجرة تنتشر في الفضاء وتختلط بالغاز والغبار، لتصبح جزءاً من السُّدُم من جديد. ومن هذه السُّدُم تولد نجوم أخرى.

هكذا تدور القصة بلا توقف: تولد النجوم في السُّدُم، وتعيش ملايين السنين وهي تضيء الكون، ثم تموت تاركة وراءها المواد التي تساعد على ولادة نجوم جديدة. لتستمر رحلة النجوم عبر الكون جيلاً بعد جيل.



في ليلة هادئة، عندما ننظر إلى السماء ونرى النجوم تتلألأ فوقنا، قد نتساءل: من أين تأتي هذه النجوم؟ وهل لها قصة مثل قصصنا؟

تبدأ القصة في أعماق الكون، في أماكن بعيدة جداً لا يمكننا الوصول إليها. هناك تنتشر سحب هائلة من الغاز والغبار تُسمى السُّدُم. تبدو السُّدُم هادئة، لكنها في الحقيقة أماكن مليئة بالحركة، ومنها تبدأ ولادة النجوم.

داخل السُّدُم تتجمع كميات كبيرة من الغاز بفعل الجاذبية. شيئاً فشيئاً تقترب هذه الغازات من بعضها حتى تتكوّن كرة ضخمة وساخنة تُسمى النجم الأولي. ومع ازدياد الحرارة والضغط في قلبها، تبدأ بإنتاج الضوء والطاقة. عندها يولد نجم جديد ويبدأ رحلته في الكون.

لكن النجوم لا تكون جميعها متشابهة، فبعضها صغير الحجم يُعرف بالأقزام الحمراء، وبعضها متوسط الحجم مثل شمسنا، بينما يكون بعضها الآخر عملاقاً وأكثر سطوعاً وحرارة.

خلال معظم حياته يعيش النجم على طاقة يصنعها بنفسه، ففي قلبه يتحول الهيدروجين إلى هيليوم، وتنتج هذه العملية كميات هائلة من الطاقة. لهذا السبب يضيء النجم ويرسل نوره وحرارته عبر الفضاء لملايين أو حتى مليارات

السنين.

كيف بدأ الإنسان رحلته مع السّماء؟

بقلم: مهدي فضلان

الجمعية العلمية الفلكية لولاية الجزائر



علماء هذه الفترة: البتاني، البيروني، الصوفي، وابن الشاطر، الذين قدّموا إنجازاتٍ مهمّة في قياس الزّمن وحركة الكواكب، لتكون هذه الحضارة مرحلة أساسيّة في تطوّر العلم، ومهمّة للمحنة القادمة.

ولادة الفلك الحديث

في عصر النهضة بدأت الثورة العلمية التي غيّرت فهمنا للكون. اقترح «كوبرنيكوس» بأنّ الشّمس هي مركز النظام الشمسي، ثمّ جاء «تيكو براهي» الذي رصد السّماء بدقّة لسنواتٍ دون تلسكوب. واستخدم «كبلر» هذه المعطيات ليكتشف أنّ الكواكب تدور في مدارات بيضاوية. بعد ذلك استخدم «غاليليو غاليلي» التلسكوب لمراقبة السّماء، فشهد جبال القمر وأقمار المشتري. لقد قدّم للبشرية أدلة قوية تدعم أن الأرض ليست مركز النظام الشمسي، ووضع «إسحاق نيوتن» قانون الجاذبية الذي يفسّر حركة الكواكب، ليؤسّس بذلك لعلم الفلك الحديث.

بعد ذلك، أصبح علم الفلك علماً واسعاً يشمل دراسة الكون كلّهِ. أوضح «آينشتاين» أنّ الجاذبية انحناءٌ في نسيج الزّمكان (زمان +مكان)، كأنّه نسيجٌ من حرير، والأجرام الكبيرة تصنع انحناءً فيه، واكتشف العلماء أنّ الكون يتمدّد، وأنّ مجرتنا واحدة من مليارات المجرات. وأرسل الإنسان مركبات فضائيّة لاستكشاف الكواكب، كما وصلت بعض المسابير إلى خارج النظام الشمسي مثل «فوييجر»، ونعيش اليوم عصر استكشاف القمر عبر مهمة «أرتميس». إضافةً إلى التلسكوبات الفضائية مثل «هابل» و«جيمس ويب» التي تكشف أسرار الكون العميقة.

كانت رحلة علم الفلك رحلة بحثٍ وتأملٍ وشغف، جعلت الإنسان يفهم الكون ويتفكّر في خلق الله سبحانه وتعالى. أمّا الآن يا عالم المستقبل، السّماء مليئةٌ بالأسرار التي تنتظر من يكتشفها، فهل أنت مستعدّ لبدء مغامراتك نحو النّجوم؟ ربّما تكون أنت العالم القادم الذي يرفع اسم الجزائر ويخدم العلم، أو من يكتشف أسراراً جديدة في الفضاء تُغيّر تاريخ البشرية. تذكّر أنّ كلّ اكتشافٍ عظيم بدأ بسؤال بسيط ونظرة إلى السّماء، فالمستقبل ينتظر من يحلم ويجرؤ على الاستكشاف!

هل تساءلتم يوماً أيّها الشّطّار الصّغار، كيف بدأ علم الفلك؟ تعالوا في رحلة شيقّة لمعرفة القصة كاملة. هيّا بنا نركب آلة الزّمن ونعود للماضي، لنرى كيف شاهد أجدادنا السّماء.. استعدّوا، فالرحلة ستبدأ الآن..

الحضارات القديمة

نحطّ الآن في زمن الحضارات الكبرى التي جاءت بعد عصور ما قبل التاريخ، حيث اكتشف الإنسان معارف جديدة عن السّماء، وتعلّمت مختلف الشّعوب طرقاً لفهم حركة الأجرام السّماوية. في بابل؛ طوّر العلماء الرياضيات، وقسموا الدائرة إلى 360 درجة، وتوقّعوا الخسوف والكسوف. وفي مصر القديمة، اعتمد الفلاحون على نجم «الشعري اليمانية» لمعرفة فيضان النيل وبداية الزراعة. كما ساهمت حضارات أخرى كالهند والصين في فهمنا لحركة الأجرام، وهكذا بدأت المعرفة الفلكية تتوسّع بين الحضارات.


تأخذنا آلة السّفر عبر الزّمن الآن لعصر الإغريق، حيث انتقل الفهم عند اليونانيين إلى مرحلة أكثر دقّة، وبدأوا باستخدام العقل والرياضيات. فاقترح «أفلاطون» و«أرسطو» كروية الأرض، واستدلّ أرسطو على ذلك من شكل ظلّها على القمر أثناء الخسوف. وتمكّن «إراتوستينس» من حساب محيط الأرض بدقّة كبيرة اعتماداً على قياس الظلال والمسافات بين المدن. أمّا «بطليموس»، فقد وضع أشهر نموذج فلكي يفسّر حركة الكواكب والكون بشكل رياضي وعقلي، ورغم عدم صحّته لأنّه كان يعتبر الأرض مركزاً للكون، إلّا أنّه كان خطوة مهمّة في تطوّر العلم، واستمرّ اعتماده لقرونٍ طويلة.

المسلمون..عباقة السماء ومطوّر الأدوات الفلكية

تطوّر علم الفلك بشكلٍ كبير، حيث لم يكتف العلماء بترجمة علوم اليونان والهند، بل طوّروها وأضافوا إليها اكتشافاتٍ مهمّة. اهتمّوا بالفلك لأغراض دينيّة وعلميّة، فأنشأوا مراصد لمراقبة السّماء بدقّة، وسجّلوا مواقع النّجوم، ووضعوا جداول فلكية عُرفت باسم «الزيج». كما طوّروا وحسّنوا العديد من الأدوات الفلكية، وابتكروا أدوات جديدة مثل الإسطرلاب، والربع المجيب، والسدس الفلكي. ومن أبرز

ألعاب وتحديات

الكلمات المتقاطعة



أفقيا

- جسيمات صخرية أو معدنية تدخل الغلاف الجوي وتترك أثراً مضيئاً
- الفرع العلمي الذي يختص بدراسة الأجرام وحركتها في الكون
- المسار الإهليلجي الذي يتبعه جسم حول نجم أو كوكب
- الجسم السماوي الذي يضيء في الليل ويكمل الأرض


عموديا

- جسم يدور حول نجم ويملك جاذبية تسمح بوجود أقمار
- جسم يبعث ضوءاً وحرارة في الفضاء بسبب تفاعلات نووية داخله
- الذي تنتشر فيه النجوم والمجرات
- تجمع هائل من النجوم والغازات والغبار يحيط بهما جاذبية مشتركة

حل الكلمات المتقاطعة:

١- كوكب ، ٢- كوكب ، ٣- كوكب ، ٤- كوكب ، ٥- كوكب ، ٦- كوكب ، ٧- كوكب ، ٨- كوكب ، ٩- كوكب ، ١٠- كوكب

رتب الصور حسب دورة حياة النجم متوسط الكتلة



بنك الكلمات : سديم، نجم أولي، نجم عملاق أحمر، سديم كوكب، قزم أبيض

الحل

١- كوكب ، ٢- كوكب ، ٣- كوكب ، ٤- كوكب ، ٥- كوكب ، ٦- كوكب ، ٧- كوكب ، ٨- كوكب ، ٩- كوكب ، ١٠- كوكب

اختبر معلوماتك عن كسوف الشمس

أكتب الإجابة الصحيحة

إعداد: حمدوش إسراء ومحمد سراج جمعية الشعري لعلم الفلك

1

ما الذي يحدث أثناء كسوف الشمس؟



- تختفي الشمس خلف القمر.
- يمر القمر بين الأرض والشمس.
- تدور الأرض حول الشمس.

الإجابة:

2

في أي طور يكون القمر عندما يحدث كسوف الشمس؟



- محاق (أي مظلماً تماماً ولا يرى).
- بدرا (دائرة كاملة).
- هلالاً.

الإجابة:

3

هل يمكن النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف؟



- نعم.
- لا، لأنه قد يضر العينين.
- فقط إذا كانت السماء غائمة.

الإجابة:

4

كم تستغرق ظاهرة كسوف الشمس كاملة عادة؟ ..



- بضع دقائق فقط.
- يوم كامل.
- بضع ساعات.

الإجابة:

5

كيف تبدو السماء أثناء الكسوف الكلي للشمس؟



- تشبه وقت الغروب أو الليل لبضع دقائق.
- تصبح مضيئة أكثر.
- تمطر مباشرة.

الإجابة:

6

ما الأداة الآمنة لمشاهدة كسوف الشمس؟



- النظارات الشمسية العادية.
- نظارات خاصة بكسوف الشمس.
- العين المجردة.

الإجابة:

7

هل يرى جميع سكان الأرض كسوف الشمس في الوقت نفسه؟



- لا، يراه فقط من يمر فوقهم ظل القمر.
- نعم.

الإجابة:

8

في أي وقت يرصد كسوف الشمس؟



- في الليل.
- عند شروق الشمس فقط.
- في النهار.

الإجابة:

9

أي جسم سماوي يسبب كسوف الشمس؟



- المريخ.
- القمر.
- الزهرة.

الإجابة:

الإجابات

١- ب ، ٢- ب ، ٣- ب ، ٤- ب ، ٥- ب ، ٦- ب ، ٧- ب ، ٨- ب ، ٩- ب ، ١٠- ب



أبرز أنشطة بعض الجمعيات والمبادرات الفلكية في الوطن العربي



رصد الاحتجابات الكوكبية من قلب صحراء أدرار



نأخذكم في رحلة معنا إلى قلب جمعية سهيل لعلم الفلك، لعيش تجربة الاحتجابات الكوكبية (Asteroid Occultations) من التخطيط إلى الميدان، وإلى غاية نشر النتائج، وللتعزف على الخطوات التقنيّة واللوجستية التي خاضتها الجمعية بالتعاون مع فريق الرصد بقيادة الدكتور بابا عيسى جوناوي، رائد علم الفلك التشاركي، لتسجيل رصد ناجح للكوكب القزم «هوميا» والكويكب «LU28 2013» في أعماق صحراء أدرار.

تبدأ العملية التقنية قبل أسابيع من الحدث من خلال دراسة خرائط الحسابات الفلكية، لتحديد استراتيجية التمرّك حسب حجم الجرم المستهدف، فبالنسبة للمسارات الكبيرة (مثل الكوكب القزم هوميا)، ولأنّ حجم هذا الأخير كبير، فالظل الذي يصنعه على الأرض يكون عريضاً، ويمتدّ لمئات الكيلومترات. لهذا كان التحدي المطروح هو توزيع التلسكوبات على مسافات متباعدة جغرافياً لالتقاط خطوط رصد متوازية، ممّا يسمح برسم الشكل الخارجي الدقيق للجرم، واكتشاف ما يحيط به من حلقات.

أمّا بالنسبة للمسارات الصغيرة والدقيقة (مثل الكويكب LU28 2013)، فهنا يكون هامش الخطأ شبه منعدم لأنّ مسار الظل ضيق جداً وخاطف، فأيّ انزياح بسيط في التقدير يعني فشل في الرصد. لذلك، تطلّبت الخطّة تقريب المسافات بين محطّات الرصد لتكون على بُعد كيلومترات قليلة فقط من بعضها البعض، لضمان التقاط الظل بشكل حتمي.

بعدها تنتقل إلى الميدان بين لوجستيك

الالتفافية للأرض.

وفي المرحلة الثالثة تمّ ضبط وضوح الصورة FOCUS والكاميرات، من خلال ربط الكاميرات الفلكية بالحواسب وضبط وضوح الصورة بدقة عالية للحصول على نجوم نقطية حادة، وهو أمر أساسي لنجاح عملية قياس الضوء. وأخيراً، ولمزامنة الوقت العالمي -وهذه هي أهمّ مرحلة- تمّ ربط أنظمة التسجيل بتوقيت أقمار GPS بدقة تصل إلى أجزاء من الألف من الثانية. فالخطأ في ثانية واحدة يعني ضياع حسابات مدار الكويكب تمامًا.

وفيما يخص العتاد المستعمل، يُشترط أن يكون هناك تكامل لتغطية كافة الاحتمالات أثناء الرصد، فقد تمّ توزيع العتاد التقني بذكاء بين الفرق:

1/ تلسكوب Celestron C8 EdgeHD: تم الاعتماد عليه لضمان الحصول على صور نجوم حادة وصافية على كامل مساحة كاميرا التصوير، ممّا يقلل من الأخطاء التقنية أثناء تحليل البيانات.

2/ تلسكوب Skywatcher 350 Flextube (قطر ١٤ بوصة): وُظف بفضل فتحته الكبيرة لتجميع أكبر قدر من الضوء، مما سمح برصد النجم الباهت جدا، والخاص بالكويكب LU28 2013، ورصد أيّ تغيير طفيف في الإضاءة لحظة الحجب.

الثمرة العلمية للرصد

النجاح الميداني لفرق جمعية «سهيل» تكلل باستخراج «المنحنيات الضوئية» للاحتجاب (وهي رسوم بيانية توضح لحظة اختفاء النجم وعودته). هذه المعطيات لا تبقى مخزنة في الحواسب الشخصية، بل يتم رفعها فوراً إلى منصات ومواقع دولية مشتركة مخصّصة لبيانات الاحتجابات الفلكية.

تشكل هذه البوابات الرقمية حلقة الوصل المثالية، حيث يرفع الهواة المحترفون أرصادهم الميدانية الموثوقة، ليستعملها الباحثون والأكاديميون في المراسد الدولية كبيانات جاهزة لتحليل أبعاد وأقطار الكويكبات، ممّا يثبت احترافية وجاهزية الكفاءات الجزائرية في المحافل العلمية الدولية.

سوريا

الجمعية الفلكية السورية نشاطات لفائدة طلبة المرحلة الإعدادية

واصلت الجمعية الفلكية السورية فعاليتها خدمة لأعضائها وللمجتمع المحلي في شتّى المدن السورية. ومن ذلك تنفيذ نشاط مع طلبة المرحلة الإعدادية المتوسطة بالتعاون مع مؤسسة «رياديو المناخ» بمناسبة يوم التساوي «Equal Day Event»، والذي نظّمه مكتب لبنان لتعليم الفلك تحت رعاية اتحاد الفلك الدولي.

كما كان هناك نشاط حاشد للامتنان هلال رمضان شارك فيه كادر الجمعية وعائلات ومهتمون، إضافة إلى تنظيم ملتقيات كان آخرها مشاركة الجمعية الفلكية السورية في المؤتمر السنوي التاسع والثلاثين لتاريخ العلوم عند العرب، والذي نظّمه معهد التراث العربي في جامعة حلب في إبريل/نيسان.



فلسطين

جامعة بيرزيت في فلسطين أنشطة رصدية رغم ظروف الاحتلال

وسط ظروف صعبة يعيشها الأهل في مختلف مناطق فلسطين بسبب التضييق تحت الاحتلال، تأثرت الأنشطة الفلكية لصعوبات التنقل خاصّة، الأمر الذي حاصر الفعاليات الفلكية.

رغم ذلك كانت هناك محاولات للعمل، ومن ذلك ما يقوم به مرصد «ميشيل وسنية حكيم» من خدمة فلكية لطلبة جامعة «بيرزيت». من أمثلة ذلك تنظيم أنشطة رصدية محدودة، كان من بينها رصد وتصوير مذنب «ليمون» C/2025 A6- Lemmon من طرف عدي زغل، أحمد دقة وخطاب أبو الرب.



الأردن

الجمعية الفلكية الأردنية محاضرات وفعاليات رصد



تم تنظيم برنامج محاضرات أسبوعيّة مع بثّ عبر تطبيق «زوم» في منتدى الجمعية الفلكية الأردنية، ومن بينها محاضرة «من المشغل إلى النجوم» حول تطوير تقنيات التلسكوب، قدّمها رامي عزب ويوسف الشيشاني، وكانت نتاج عملهما على مدى أسابيع. كما قدّم خالد التل محاضرة في أساسيات فلكية بعنوان «ظواهر فلكية جميلة». وضمن سلسلة قدّمت أفنان أبو قليشة «فيزياء ومبادئ عمل التلسكوب»، وتحضيراً للفعاليات الرمضانية كانت هناك ورشة بعنوان: «ما نحتاج فهمه عن الهلال» بإشراف مروان الشويكي وأفنان أبو قليشة ودلال اللالا ويحيى عيد، وتبع ذلك فعاليات رصد كبيرتان في مدرسة حكومية بإشراف كل من حسين لبزو وجمانة حجازين، لتتّوج هذه الفعاليات برصد حاشد أقامته الجمعية بالتعاون مع جامعة عمّان العربية، وذلك بإشراف رئيس الجمعية عمار السكجي، بحضور المئات لرصد هلال رمضان 1427 هـ. كما نظّمت عدّة خرجات رصدية كان آخرها في منطقة «سدّ الحرث» جنوب شرق عمان بإشراف عدلي الحلبي وإمام حمدي.

العراق

فريق دار السلام الفلكي ببغداد أطفال يستكشفون قبة الأسرار الفلكية



قام فريق دار السلام الفلكي ببغداد في العراق، وبإشراف سماح فلاح وثلة من الشباب والشابات الواعدين، بتنظيم فعاليات متنوّعة من أهمّها سلسلة من المخيمات والخرجات الرصدية في أماكن منتقاة، بعيداً عن التلوّث الضوئي، ومن ذلك المخيم الفلكي الكشفي الذي أقيم لصالح مديرية شباب ورياضة المثنى، عقب ذلك تم توزيع شهادات المشاركة على المشاركين. من جهة أخرى تم تنشيط قبة الأسرار الفلكية المتنقّلة في عروضها المقدمة للأطفال والناشئة، حيث تلقت تفاعلاً كبيراً.



الأخبار الفلكية الإفريقية

بقلم: جمال ميموني
وحدة البحث في الوساطة العلمية



مؤتمر الجمعية الأفريقية لعلم الفلك لعام 2026



كان الحدث الأبرز في النصف الأول من العام هو المؤتمر السنوي السادس للجمعية الأفريقية لعلم الفلك، الذي استضافته جامعة بوتسوانا الدولية للعلوم والتكنولوجيا في كاساني، في الفترة الممتدة من 22 إلى 27 مارس 2026. وشهد المؤتمر أكبر حضور في تاريخ الجمعية، حيث تجاوز عدد المشاركين المسجلين 600 مشارك، وحضر أكثر من 200 شخصياً. وفي هذا المؤتمر، مُنح الدكتور غودسون فورتشن آبي (من جامعة كوبريليت في زامبيا) جائزة أفضل أطروحة دكتوراه على مستوى أفريقيا، وذلك لأبحاثه حول انفجارات أشعة غاما.

وقد تحدث دراسته الافتراض التقليدي بأن الفوتون عديم الكتلة، مستنتجة كتلة غير صفريّة للفوتون ($10 \times 0.009 \pm 1.58 \text{ kg}^{37}$) استناداً إلى التأخيرات الزمنية في وصول الفوتونات. بطبيعة الحال، لم يقبل الجميع هذه النتيجة، بما في ذلك كاتب هذا القسم. كما تطوع أكثر من 50 شخصاً للتواصل مع أكثر من 500 متعلم و30 معلماً في منطقة تشوبي، حيث قدموا التوجيه المهني وورش عمل في الروبوتات وعروضاً بالقبعة السماوية المتنقلة. وشهد المؤتمر أيضاً النسخة الرابعة من هاكا تون الجمعية الأفريقية لعلم الفلك، الذي تحدى 28 طالباً أفريقياً لتطوير نماذج تعلم آلي قادرة على تقدير المسافات الانزياحية للمجرات والكوازارات، باستخدام بيانات ضوئية متعددة النطاقات.

جنوب أفريقيا تستضيف أسبوع كارمان

للمرة الأولى في تاريخه الذي يمتد سبع سنوات، سيُقام أسبوع كارمان المرموق في القارة الأفريقية، ومن المقرر عقده في الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026 في كيب تاون. وسيستضيف الحدث، الذي يُقام بدعوة فقط، 15 من قادة الفضاء العالميين البارزين لتعزيز التعاون عبر الحدود وبناء الثقة في قطاع الفضاء.

مشروع SKA-Mid يحقق «الترابط الأول»

حقق مرصد مصفوفة الكيلومتر المربع «الترابط الأول» باستخدام اثنين من أطباقه متوسطة التردد في جنوب أفريقيا، وقد أثبت هذا الإنجاز الهندسي الحاسم بنجاح لأول مرة قدرة الأطباق على العمل معاً كجهاز تداخل.



التعليم وبناء القدرات



أ- فتح باب الترشح لمنح PAP2SN:



في 2 أبريل 2026، فتحت الشبكة الأفريقية لعلوم وتكنولوجيا الكواكب رسمياً باب التقديم لمنح التنقل الأكاديمي، حيث يمول البرنامج الطلاب الأفارقة لدراسة الماجستير والدكتوراه في علوم الكواكب والفضاء، مع تخصيص 50% من المنح بشكل صريح للنساء والمرشحين من الفئات المهمشة.

ب- المدرسة الصيفية للجمعية الفلكية الأفريقية في علم الفلك والفيزياء الفلكية (بنين)

وفي الفترة من 6 إلى 9 يوليو 2026، أُقيمت المدرسة الصيفية للجمعية الأفريقية لعلم الفلك في علم الفلك والفيزياء الفلكية، في قسم الفيزياء بكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة كالافي. وقد ولدت هذه المبادرة من مناقشات سابقة في فبراير 2026 بهدف دمج علم الفلك والفيزياء الفلكية في البرامج الجامعية القائمة. وتمثلت الأهداف الأساسية في دعم المدرسة الصيفية، وتشكيل مستقبل تدرّس علم الفلك في بنين، وتعزيز التعاون الدولي، وتحديد الأنشطة البحثية المستقبلية. وقد شارك في الحدث نحو 25 مشاركاً، واستهدف تحديداً المحاضرين الجامعيين ومرشحي الدكتوراه والأكاديميين في بداية مسيرتهم المهنية لخلق تأثير مضاعف للمناهج الفلكية في الجامعات البنينية. ونُظمت المدرسة بجهود مشتركة بين جامعة كالافي والجمعية الأفريقية لعلم الفلك، وحظيت بدعم دولي كبير من الاتحاد الفلكي الدولي، ومرصد جنوب أفريقيا للراديو الفلكي، وجامعة جنوب أفريقيا، ومجلة العلوم الأفريقية African Science Star ومركز البحث العلمي والتقني في الجزائر.

الجزائر توسع الأسطول الفضائي الأفريقي

في يناير 2026، أطلقت الجزائر بنجاح قمرين صناعيين جديدين، وهما ALSAT-3A و ALSAT-3B، إلى المدار. وقد وشع هذا الإنجاز الوجود الأفريقي في مدار الأرض، ليصل العدد الإجمالي للأقمار الصناعية التي أطلقتها الدول الأفريقية منذ عام 1998 إلى 69 قمراً، مما يعزز قدرات القارة في مراقبة البيئة والاستجابة للكوارث.

أول اتصال مباشر لكينيا مع محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الكينية أنها ستستضيف أول جلسة اتصال مباشر في تاريخ البلاد مع رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية في 7 أغسطس 2026. وسيعقد هذا الحدث في نيروبي، وهو مصمم لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإلهام جيل جديد من الشباب الكيني، مما يجعل كينيا الدولة الأفريقية الوحيدة المختارة لدورة 2026 من برنامج ARISS.



الإنجازات في البنية التحتية والتمويل

شهد مطلع العام التزامات مالية ودولية كبرى لمشاريع البنية التحتية المستضيفة في أفريقيا، ومن أبرزها مضاعفة ميزانية التلسكوب الجنوب أفريقي (SKA)، حيث أعلنت وزيرة المالية الجنوب أفريقية في فبراير 2026 أن البلاد ستضاعف إنفاقها على البنية التحتية لمشروع مصفوفة الكيلومتر المربع، وتخصص ميزانية 2026 مبلغ 3 مليارات راند إضافية على مدى ثلاث سنوات لتمديد مصفوفة ميركات، ومراكز معالجة البيانات، وربط ألياف بصرية إلى كيب تاون. وفي يونيو 2026، وقّعت الجمعية الأفريقية لعلم الفلك مذكرة تفاهم مع الجمعية الأوروبية لعلم الفلك، حيث تُرسي الاتفاقية إطاراً طويل الأمد لتعزيز التنقل الثنائي للباحثين، وتطوير القدرات، والتعاون في البنية التحتية الفلكية بين أفريقيا وأوروبا. كما أُعلن في 17 يونيو 2026 أن مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ستستضيف أسبوع كارمان المرموق في نوفمبر 2026، وهي المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث العالمي الحصري، بدعوة فقط لقادة الفضاء البارزين، في القارة الأفريقية.

مقرب سالت يتعاون مع مرصد فيرا روبين

في فبراير 2026، بدأ المقرب الجنوبي الأفريقي الكبير والتلسكوب الآلي لي سيدي (بقطر متر واحد) رسمياً في متابعة التنبهات الفلكية الصادرة عن مرصد فيرا روبين الواقع في تشيلي. وبلاستفادة من الموقع الجغرافي لجنوب أفريقيا وبرنامج المرصد الذي، ستوفر هذه التلسكوبات توصيفاً طيفياً مفصلاً وسريعاً للأحداث الديناميكية مثل المستعرات الأعظمية والثقوب السوداء المتوهجة.

اكتشاف قياسي بواسطة تلسكوب ميركات

اكتشف علماء الفلك باستخدام تلسكوب ميركات الراديوي الجنوب أفريقي أبعد ميزر هيدروكسيل عملاق تم اكتشافه على الإطلاق، وهو عبارة عن «ليزر فضائي» طبيعي، يقع في مجرة تندمج بعنف على بعد أكثر من 8 مليارات سنة ضوئية. وقد تم التقاط الإشارة الخافتة في خمس ساعات فقط من وقت الرصد، بمساعدة عدسة الجاذبية.





فيلم: مشروع هيل ماري

يروى فيلم Project Hail Mary، المقتبس عن رواية آندي وير، قصة عالم الأحياء رايلاند غريس الذي يستيقظ وحيداً على متن مركبة فضائية، ليكتشف أنه في مهمة مصيرية لإنقاذ الأرض من ظاهرة غامضة تهدد بانخفاض طاقة الشمس.

يمزج الفيلم بين الخيال العلمي ومفاهيم حقيقية في الفيزياء الفلكية والأحياء الدقيقة، حيث يعتمد الأبطال على المنهج العلمي، والتجارب، والتحليل الطيفي، والاستنتاج المنطقي لفهم المشكلة وإيجاد الحلول. ورغم أن الفرضية الأساسية خيالية، فإن طريقة تناولها تجعل الفيلم من أكثر أعمال الخيال العلمي احتراماً للعلم. يؤكد الفيلم أن المعرفة، والتعاون، والإبداع العلمي هي أعظم أدوات البشرية لمواجهة المجهول، ويقدم تجربة مشوقة تذكرنا بأن العلم لا يقتصر على المختبرات، بل قد يكون مفتاح إنقاذ العالم.



رجل القش




يعتبر كتاب «رجل القش»: الدليل المختصر للمغالطات المنطقية والانحيازات الإدراكية، للمهندس يوسف صامت بوحايك، الباحث الجزائري في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة، دليلاً فعلياً يساهم في تقريب وتبسيط المنطق اللاصوري والتفكير النقدي لغير المتخصصين.

في بداية الكتاب يشرح المؤلف مفاهيم أساسية تتعلق بالتفكير وعلاقته بالمنطق، والاستدلال وتركيبه الصحيح، ثم مفهوم المنطق، ليوضح بعد ذلك العلاقة بين الدليل والتفسير المنطقي ووجهات النظر، معتمداً على أسلوب سلس ومفهوم مدعم بأمثلة من نقاشاتنا اليومية، قبل أن يبدأ في شرح مختلف المغالطات المنطقية والانحيازات الإدراكية التي يمكن أن يقع فيها العقل البشري بقصد أو عن غير قصد.

ويستعرض الكاتب أهم المغالطات المنطقية فيشرح الأخطاء الشائعة في الاستدلال وكيفية الرد عليها، مثل «مغالطة رجل القش» التي تعني تحريف حجة الخصم لتسهيل مهاجمتها، بالإضافة إلى مغالطات أخرى كالتهميم المتسرع والمنحدر الزلق ومغالطة الشخصية وغيرها. كما يقدم المؤلف مجموعة من الانحيازات الإدراكية، ليوضح كيف تتأثر أحكامنا العقلية بأمور كالانطباع الأول، والانحياز التأكيد.

باستخدام لغة بسيطة تتجنب المفاهيم الفلسفية المعقدة، يكشف لنا الكتاب أساليب الخداع المستعملة في عملية الاستدلال ومواطن الخلل المرافقة لها في عملية التفكير، لذلك يُعد مرجعاً مهماً لغير المتخصصين الراغبين في التعمق في المنطق اللاصوري والتفكير النقدي.





اللجنة العلمية

CERIST & جامعة قسنطينة 1 - الجزائر
الجامعة الأمريكية بالشارقة- إ.ع.م.
NQCC & RAL - Oxford
المملكة المتحدة
مركز CRAAG - الجزائر العاصمة - الجزائر
جامعة سطيف - الجزائر
رئيس الجمعية الفلكية التونسية - تونس
مركز الفلك الدولي، ICOP، أبو ظبي- إ.ع.م.
مكتبة الإسكندرية، المركز العلمي - مصر
جامعة سيدة اللويزة Notre Dame - لبنان
جامعة الأقصى، غزة، وجامعة كالغاري، ألبيرتا، كندا
جامعة نيويورك - أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة

جمال ميموني
نضال قسوم
حمزة لبيض
نسيم سغواني
شرف شابو
سفيان كمون
محمد عودة
عمر فكري
روجيه حجار
سليمان بركة
رياض بغداددي

Jamal Mimouni	CERIST & Univ. Constantine1, Algeria
Nidhal Guessoum	American Univ. of Sharjah, UAE
Hamza Labiad	NQCC - RAL Space Oxford., UK
Nassim Seghouani	CRAAG, Algiers, Algeria
Charaf Chabou	Sétif Univ., Algeria
Sofien Kamoun	Société Astronomique de Tunisie <SAT>, Tunisia
Mohamed Odeh	Intl. Center of Astronomy, ICOP, Abu Dhabi, UAE
Omar Fikri	Bibliotheca Alexandrina, Science Center, Egypt
Roger Hajjar	Notre Dame Univ., Lebanon
Suleiman Baraka	Al-Aqsa Univ., Gaza & Univ. Calgary, Alberta, Canada
Riyadh Baghdadi	NewYork Univ., Abu Dhabi, UAE

“Scientific Echiheb” is a science magazine edited by the Research Unit in Scientific Mediation (CERIST-Constantine) and the Sirius Astronomy Association at Constantine in Algeria, in collaboration with the Directorate of Scientific Research and Technological Development (DGRSDT). It tackles scientific issues of timely relevance with a strong focus on astronomical ones. It aims at spreading scientific culture through original articles written by astronomers both professional and amateurs, as well as students from various scientific fields, making sure that the information provided is from reliable sources and we are strongly committed to relentlessly fight against this new age curse that is fake news.. It also makes a point of bringing the facts from leaders in the fields around the world by conducting extensive interviews with some of them.

The name of the magazine is inspired by the Echiheb magazine founded by Sheikh Abd El-Hamid Ibn Badis, the founder of the Association of Algerian Ulema which was instrumental in preparing the Algerian people for the struggle for independence.



فريق المجلة

رئيس التحرير
ياسمين بوالجدردي
الإشراف العام و التدقيق العلمي
جمال ميموني
مسؤول التصميم و الأعمال الفنية
هشام قرقوري
التدقيق اللغوي
ياسمين بوالجدردي، فلة داود

التحرير
عمر نمول، هشام قرقوري، ياسمين بوالجدردي،
جمال ميموني، الشيماء أمين خوجة، فلة داود

Editor in Chief
Bouldjedri Yasmine

General Supervision
Jamal Mimouni

Design & Graphics
Hichem Guergouri

The Editorial Team
Omar Nemoul, Hichem Guergouri, Yasmine
Bouldjedri, Jamal Mimouni, Echeima Amine
Khodja, Fella Daoud

Linguistic Review Team
Yasmine Bouldjedri, Fella Daoud

+213 (0) 771 56 06 58
http://mediation.cerist.dz/chiheb
www.cerist.dz
chihebmagazine@gmail.com

Editorial

Between the Pulsations of the Stars and the Sorrows of Humanity

A century ago, astronomy barely touched upon the secrets of the stars. Today, we conceive the star as the most fundamental object in the universe. Much like the biological cell is the elementary building block of living things, the star is the indispensable matrix for cosmic complexity, forging the heavy elements essential to life. Within its core, these heavy elements are forged, and around it, planetary systems organize, weaving the backdrop of galactic ecology.

This eleventh issue plunges you into the heart of the “Stellar World.” In our main dossier, our contributors explore the internal workings of these thermonuclear reactors. We also have the honor of hosting within our pages the Danish researcher Jørgen Christensen-Dalsgaard, a major figure in stellar physics and the spiritual father of asteroseismology, a booming field that probes stellar vibrations to map the invisible interior of stars. Furthermore, we give the floor to Carla Sharpe for the Africa2Moon project, a landmark initiative led by the Foundation for Space Development Africa aimed at deploying the continent’s first scientific mission to the Moon while inspiring the next generation of African scientists and engineers.

As usual, the various other sciences are generously covered. Notably, we welcome the Algerian researcher Karim Zaghib, a world authority on lithium batteries, who deciphers for us the future of this “white gold” of the energy transition and the strategic opportunities it holds for Algeria. Moreover, from fundamental physics to regional technological advancements, this issue offers a rich and accessible panorama for all curious minds. Our usual sections, including the spaces dedicated to young readers and major scientific news, continue to build bridges between academic rigor and public dissemination.

Yet, our eyes cannot turn away from earthly realities. The dossier on Gaza is here, as always, with a special focus on the “Gaza Reads” (غزة تقرأ) initiative. Amidst the rubble, this campaign demonstrates that knowledge remains the ultimate weapon of resilience. Just as stars convert their matter into light, the people of Gaza transform their pain into an exemplary intellectual awakening. Out of the ashes of destruction, the light of reconstruction will undoubtedly emerge. May this issue remind us that the quest for knowledge is inseparable from human dignity. Asteroseismology teaches us to listen to the hidden vibrations of the stars; history compels us to listen to the pulsing courage of oppressed peoples.

Jamal Mimouni

Table of Contents

Thematic Dossier : The Stellar World

- How Stars are Born and how they Die?, Hichem Guergouri
- Stellar Diversity: How Light Reveals the Secrets of the Universe , Omar Nemoul
- When Stars Break the Rules of Physics, Jamal Mimouni
- Pa 30: Solving an 850 - Year-Old Mystery, Jamal Mimouni
- The Issue's Guest: Jørgen Christensen-Dalsgaard: The Astronomer Who Taught Us to Listen to the Stars
- 2026 Shaw Prize in Astronomy: Two Scientists Win for Their contribution to Stellar Astrophysics

General Science Articles & Activities

- Interview with Carla Mitchell The Woman Behind “Africa2Moon” Project
- Interview with Prof. Karim Zaghib: Lithium.. The White Gold
- Mission Artemis II: A Renewed Dream of Returning to the Moon, Echeima Amine Khodja
- Beyond Solar Panels: The Hidden Science Behind Clean Energy, Aissa Meflah
- Solar Energy on the Moon, Fatima Zahra Benarab
- Hydrology; Understanding Groundwater and Geothermal Energy, Tarek Drias
- Abu al-Nasr Mansur Ibn Iraq, Boubaker Khaled Sadallah
- An Astronomical Adventure in the Heart of the Algerian Sahara, Amr Abdulwahab

Science Paparazzi

- Latest Science News, Jamal Mimouni & Echeima Amine Khodja

Special Issue’s file

- Daughter of More Than One Father: Palestinian Artist Fatima Ali Abu Ouda
- “Gaza Reads” Initiative: A Battle to Save Memory — Yasmine Bouldjedri
- Empty Pots Tell a Human Tragedy: The Food Crisis Deepens the Suffering of Gaza’s Displaced
- 45°C Under the Tents: A Century of Ongoing Environmental Destruction

The Smarties Corner

- Discover the Life Story of Stars — Khadidja Toubal
- How Did Humanity Begin Its Journey with the Sky? — Mehdi Fadlane
- Test Your Knowledge of Solar Eclipses — Israa & Mohamed Siraj Hamdouche
- Test Your Knowledge, Echeima Amine Khodja

From Each Nebula a Star

- Algerian, Arab & African Astronomy Activities
- Popcorn...Science and Fiction: Project Hail Mary, Hichem Guergouri
- The Best Companion Reader: “The Scarecrow”, Yasmine Bouldjedri



من تصوير: عمر عبد الوهاب بصحراء الجزائر